

AJ MIERNA MYOKARDITÍDA Z COVIDOVÝCH VAKCÍN SPÔSOBUJE SMRTELNÚ ARYTMIU, potvrdila japonská štúdia

- CZ24 News | 11. března 2024

JAPONSKO: Nový výskum z Japonska dokázal, že aj mierna myokarditída môže viesť k smrteľným arytmiám - čo je ďalší veľký dôkaz, že vakcíny proti Covidu-19 sú nebezpečné.

Tvrdí to *Poradný tím pre zdravie a zotavenie* (Health Advisory and Recovery Team - HART). Ide o skupinu vysokokvalifikovaných lekárov, vedcov a ďalších vedeckých a akademických odborníkov z Veľkej Británie, ktorí zverejnili odporúčania týkajúce sa záverov štúdie.

Myokarditída je zápal myokardu, respektíve srdcového svalu. Je o nej známe, že spôsobuje bolesť na hrudníku, dýchavičnosť a rôzne druhy arytmií.

Nová práca publikovaná v odbornom lekárskom časopise *Medicine* (Medicína) s otvoreným prístupom a vedená patológmi z Kanazawy v Japonsku uvádza, že ich zistenia pochádzajú z pitvy zdravého 40-ročného muža.

„Zdravý 40-ročný Japonec náhle pocítil tachykardiu a stratil vedomie dva dni po očkovaní mRNA vakcínou proti Covidu-19,“ uvádza sa v správe. *„Pokračovanie v resuscitácii obnovilo spontánny tlkot srdca, pacient však nenadobudol vedomie a o 9 dní neskôr zomrel.“*

(Súvisiace: Prípady post-covidovej injekčnej myokarditídy naďalej raketovo rastú, zistila [štúdia](#).)

Štúdia ďalej zistila, že pri pitve pacientove kardiomyocyty (bunky srdcového svalu) prechádzali procesom nekrotickej smrti a „boli rozptýlené v pravej aj ľavej srdcovej komore“. Štúdia tiež uviedla, že pacientova myokarditída „bola fokálna (v ohniskách) a mierna, ako sa väčšinou pozoruje po očkovaní mRNA vakcínami proti Covidu-19“.

Zápalové ložiská však boli blízko prevodového systému srdca a považovali sa za príčinu smrteľnej arytmie. Štúdia zistila, že pacient bol testovaný na Covid-19 negatívne.

Smrť muža súvisiaca s očkovaním bola utajená

Skupina HART vyjadrila svoje znepokojenie nad tým, že keďže k smrteľnej arytmií došlo po druhej dávke, zdá sa pravdepodobné, že prípad nebol hlásený z dôvodu obáv, že takéto hlásenie by mohlo ovplyvniť ochotu ľudí dať sa zaočkovať proti Covidu-19.

„Možnosť, že zápal ovplyvňujúci iba spojivový systém môže viesť k smrteľnej arytmií, vytvára obavu, ktorú sme predtým vyjadrili v súvislosti s mRNA produktmi,“ uviedla skupina HART.

„Je potrebné poznamenať, že u tohto muža sa náhle prejavila arytmia (ventrikulárna tachykardia), ktorá sa nakoniec ukázala ako smrteľná. Predchádzajúca bolesť na hrudníku, charakteristická pre myokarditídu, nebola hlásená.“

To je v súlade s obavami, ktoré vzniesla HART, že subklinická (bezpríznaková) myokarditída skutočne vedie k zvýšenému riziku smrteľných arytmií, ktoré môžu byť zodpovedné za väčšinu alebo dokonca za celý nárast počtu volaní sanitiek pri zástavách srdca.

Subklinická myokarditída je definovaná ako zvýšenie troponínu svedčiace o určitom poškodení srdca. Bola zistená najmenej u jedného z 50 ľudí, ktorým bola podaná [mRNA vakcína](#) proti Covidu-19 v tých štúdiách, kde ju výskumníci cielene hľadali.

Dr. Clare Craigová, patologička a spolupredsedníčka skupiny HART, ďalej poznamenala, že úroveň detailov, do ktorej šla japonská pitva, bola potrebná na to, aby sa zistilo, ako blízko sú oblasti zápalu k prevodovému systému. Túto zručnosť majú podľa nej len niektorí patológovia.

Okrem toho sa typ pitvy vykonanej na japonskom pacientovi bežne nevykonáva v západnom svete, vrátane Veľkej Británie, kde pôsobí skupina HART.

Pozrite si tento [krátky klip](#) (v angličtine) pojednávajúci o úmrtí 17-ročného dievčaťa na myokarditídu, za ktorého smrť vraj môže všetko iné, len nie vakcína:

AUTOR: Ava Grace

Překlad: Badatel

[ZDROJ](#)