

Alarmující studie: 27 % Saúdů má srdeční problémy po očkování takzvanou mRNA „vakcinou“

- editor007 | 7. dubna 2024

SAUDSKÁ ARÁBIE: Saúdská Arábie patří k nejproočkovanějším zemím světa. Drtivá většina populace má v sobě alespoň jednu dávku mRNA injekcí. Podobně jako na Západě i tam byly nejčastěji aplikovány mRNA injekce Pfizer a Moderna.

Studie ze Saúdské Arábie, o níž informoval server TrialSite News, zjistila, že 27,11 % účastníků mělo po očkování mRNA COVID-19 srdeční komplikace, ke kterým došlo v různém období po podání injekce, ale maximálně po něco víc než roce.

Více než čtvrtina účastníků studie [ze Saúdské Arábie](#) hlásila srdeční komplikace po podání vakcíny mRNA COVID-19 a mnoho z nich vyžadovalo hospitalizaci nebo intenzivní péči.

Studie, kterou vedl mikrobiolog a imunolog [Muazzam M. Sheriff](#) a kolegové z [Ibn Sina National College for Medical Studies](#) a [King Faisal General Hospital](#), odhalila, že 27,11 % dotázaných jedinců mělo po očkování proti COVID-19 problémy se srdcem .

Nástup srdečních komplikací se mezi účastníky lišil, přičemž 14,55 % mělo příznaky do jednoho měsíce po očkování a jiní hlásili problémy až 12 měsíců nebo déle.

TrialSite News ve středu informovaly o „[bombové saúdskoarabské studii](#).“

Zakladatel, Daniel O'Connor, řekl The Defender, že ačkoli studie má omezení a byla navržena tak, aby hledala srdeční komplikace, „míra hospitalizovaných případů byla jistě pozoruhodná, zejména s ohledem na existující srdeční problémy spojené s vakcínami (myokarditida, perikarditida).“

Kardiolog a epidemiolog [Dr. Peter A. McCullough](#) uvedl, že kromě velkého počtu [kardiovaskulárních příznaků](#) vyžadujících hospitalizaci, 15,8 % přistálo na jednotce intenzivní péče (JIP).

„Více než polovina subjektů uvedla, že byli ovlivněni zdravotníkem nebo vládní agenturou, aby se nechali očkovat,“ řekl McCullough The Defender. „Nikdy v poslední době nebyla pro veřejnost uvolněna taková kardiotoxická vakcína.“

O'Connor zdůraznil rostoucí obavy týkající se potenciálních dlouhodobých [účinků vakcín proti COVID-19](#) na kardiovaskulární zdraví a řekl: „Nárůst srdečních příhod ve zprávách za poslední rok nebo dva nikoho netěší.“

Saúdskoarabská studie publikovaná v lékařském časopise Cureus použila průřezový design a přijala 804 účastníků (379 mužů, 425 žen ve věku 18 let a starších), kteří dostali alespoň jednu dávku mRNA vakcíny COVID-19 (Pfizer-BioNTech , Moderna nebo obojí - 58 dostalo jinou značku).

Téměř 40 % dostalo pouze jediné očkování. Účastníci vyplnili kulturně upravený dotazník, který zahrnoval demografické údaje, historii očkování, zdravotní stav a vnímání vakcín.

U 27,11 % postižených účastníků se vyskytly různé stupně srdečních komplikací: u 14,55 % se projevíly během jednoho měsíce po očkování, u 6,97 % mezi jedním a třemi měsíci a u dalších do 12

měsíců nebo déle po očkování.

U 15,8 % pacientů léčených na jednotce intenzivní péče a 11,44 % na oddělení všeobecné nemocnice trvala ústavní léčba méně než jeden den až několik týdnů, přičemž 8,33 % v nemocnici strávilo čtyři až sedm dní.

Mnoho účastníků bylo léčeno pro srdeční komplikace. 9,45 % účastníků dostávalo lékařskou péči déle než 12 měsíců a 7,11 % bylo v době průzkumu v probíhající léčbě.

Šedesát pět procent subjektů uvedlo, že jsou „neutrální“, „poněkud nevěří“ nebo „vůbec nevěří“ v bezpečnost mRNA vakcín, zatímco pouze asi 20 % uvedlo, že věří, že jejich srdeční příznaky souvisí s vakcínami.

Studie také zjistila vysokou míru již existujících zdravotních stavů mezi účastníky, včetně cukrovky (48,26 %), vysokého krevního tlaku (56,72 %), obezity (39,15 %) a fyzické nečinnosti (22,14 %).

Podle autorů studie mohly tyto komorbidity přispět ke zvýšenému riziku srdečních komplikací po vakcinaci mRNA.

„Navzdory zaujatosti ve strategii náboru zaměřené na nalezení pacientů s kardiovaskulárními vedlejšími účinky mRNA, je to vysoké procento, které vyžaduje léčbu v nemocnici nebo intenzivní péči,“ řekl McCullough.

„Je potřeba více údajů o těchto případech, včetně diagnózy, léčby a výsledků, jako jsou opakované hospitalizace a úmrtí,“ dodal.

Autoři studie zdůraznili, že je třeba dále zkoumat specifické rizikové faktory a biologické mechanismy, které se mohou podílet na rozvoji srdečních komplikací po očkování.

TrialSite News nazval studii „přesvědčivou z hlediska metodologie, relevance a etických úvah“ a poznamenal, že autoři příliš bagatelizují velikost reakce, i když míra srdečních komplikací se zdá být strašně vysoká.

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda

[ZDROJ](#)