

ANALYTIK JURAJ MESÍK: IVERMECTIN AKO LIEK NA COVID JE TAK BEZPEČNÝ, ŽE HO MÔŽU UŽÍVAŤ DOKONCA AJ MALÉ DETI A TEHOTNÉ ŽENY

- CZ24 News | 11. března 2021



SLOVENSKO: Slováci sa v boji proti koronavírusu v počiatkovej fáze najviac spoliehajú na Ivermectin. Vhodnosťou použitia lieku u malých detí či tehotných žien sa v statu [zaoberá](#) analytik globálnych rizík a vyštudovaný lekár Juraj Mesík.

O Ivermectine sa vedú neustále polemiky aj medzi odborníkmi a lekármi. Isté ale je, že zaberá. Svedčia o tom mnohé pozitívne ohlasy nielen pacientov, ale i viacerých lekárov. Môžu ho však používať všetci? Analytik a vyštudovaný lekár Juraj Mesík sa vo statu zaoberá vhodnosťou liečby Ivermectinom pre niektoré skupiny ľudí.

Pri hnačkách tablety rozdrvíme a zmiešame s banánom alebo varenou ryžou

Môže sa Ivermectin podávať malým deťom? „Lekári sú pri podávaní liekov deťom vždy extra opatrní, platí to aj o Ivermectine (hoci je to liek na zozname základných liečiv WHO pre deti). Všeobecne sa hovorí o hmotnosti od 15 kg. V tejto francúzskej štúdii uverejnenej v 2019 podávali v 28 strediskách Ivermectin 170 deťom vo veku od 1 do 64 mesiacov a hmotnosti od 4 do 15 kg. Mierne vedľajšie účinky pozorovali u 7 detí (4 %), vážne u žiadneho“ uvádza Juraj Mesík.

Ako je to v prípade tehotných žien? „Opäť, lekári sú v tehotenstve pri každom lieku extra opatrní. V tejto prehľadovej štúdii uverejnenej v The Lancet v roku 2020 autori pri cca 900 prípadoch tehotenstiev nezaznamenali žiadne problémy. To nie je možné interpretovať ako dôkaz, že neexistuje

žiadne riziko, ale indikuje to, že riziko pre matku a plod je, aspoň v neskoršej fáze tehotenstva, zrejme pomerne nízke,“ konštatuje analytik.

„U pacientov u ktorých sa Covid prejavuje aj hnačkami, môže byť podanie tabletiiek Ivermectinu menej účinné. Prejdú totiž trávením skôr, ako sa stihnú vstrebať a výsledok je, že sa do krvi a tkanív nedostane potrebná dávka. Tomu sa dá predísť tým, že tabletky rozdrvíte, pomiešate s banánom alebo varenou ryžou a zjete v tejto forme. Ivermectin potom ide tráviacim traktom pomalšie a je čas na to aby sa vstrebal. Alternatíva môže byť pasta, niektorí ľudia písali aj o účinnosti vtierania vypočítanej dávky roztoku Ivermectinu do kože, napríklad v laktových jamkách (ten, kto liek podáva, musí použiť rukavice, aby sa nevsal do jeho prstov),“ dodáva na záver Mesík.

Autor: Jozef Uhlárik

Zdroj: <https://www.hlavnydennik.sk/>