

Britský analytik Ivor Cummins: NEZABÍJA COVID, ALE LOCKDOWNY - A TO HLAVNE MLADÝCH ĽUDÍ!

- CZ24 News | 28. listopadu 2020



Média na celom svete strašia, ako ochorenie COVID-19 vyvoláva tisíce úmrtí. Následne sa tieto počty úmrtí spolu s „novými pozitívnymi prípadmi“ využívajú na stále sa rozširujúce obmedzenia a okliešťovanie ľudských práv.

Britský dátový analytik Ivor Cummins, špecializujúci sa na oblasť bio-inžinieringu, podrobne vyhodnotil dáta nadmerných úmrtí v Anglicku počas celej pandémie. No a to, čo objavil, všetkým vyrazilo dych.

Čo je to „nadmerné úmrtie“

Na úvod si vysvetlíme, čo sa vlastne rozumie pod pojmom „nadmerné úmrtie“.

Takže, najprv si vezmeme všetky úmrtia (bez zisťovania príčiny úmrtia) v krajine, napríklad v jednotlivých kalendárnych týždňoch za posledných pár rokov a urobme si z toho priemer.

Teraz počas epidémie nebudeme sledovať, koľko ľudí v jednotlivých týždňoch zomrelo na COVID-19 či iné choroby (rakovina, choroby srdca a podobne), ale opäť vezmeme všetky úmrtia bez rozdielu.

Následne porovnáme počet súčasných týždenných úmrtí s priemerom za predošlé roky. Ak zistíme rozdiel, tak ide o „nadmerné úmrtia“, ktoré budeme považovať za úmrtia spôsobené COVID-19.

Tento spôsob sledovania úmrtí má tú výhodu, že odpadajú pochybnosti, či nejaký človek zomrel „s“ kovidom, kde primárnou príčinou bolo iné ochorenie (napríklad infarkt) alebo či zomrel „na“ kovid, ktorý bol hlavnou príčinou úmrtia.

K takýmto pochybnostiam totiž často dochádza, keď sa odborníci hádajú, koho do štatistík úmrtí na COVID-19 zaradiť a koho nie.

Pri nadmerných úmrtiach tento problém odpadá, keďže sledujeme koľko ľudí zomrelo v tomto roku viac ako po minulé roky a automaticky predpokladáme, že ich má na svedomí COVID-19.

Samozrejme, nie je to úplne ideálne riešenie, ale lepšie ako sa handrkovať pri určovaní príčiny úmrtia.

Čo zistil dátový analytik

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť krátku, ani nie 3 minútovú prezentáciu spomínaného britského dátového analytika (v angličtine):

Tí z vás, ktorí nehovoria anglicky, v nasledujúcom texte uvádzame prepis hlavných zistení.

Graf č.1: Týždenné nadmerné úmrtia v nemocniciach

Na prvom grafe je vidieť po jednotlivých týždňoch vývoj nadmerných úmrtí v nemocniciach.

Kým na začiatku pandémie počas prvej vlny od marca do mája 2020 sa vyskytli v priebehu asi 7 týždňov nadmerné úmrtia, po zvyšok roka až do októbra pozorujeme dokonca nižší počet úmrtí ako po minulé roky.

Zhodnotenie: K nadmerným úmrtiam počas druhej vlny pandémie nedochádza v nemocniciach, takže zrejme starí ľudia nezomierajú viac ako inokedy, nakoľko tí tvoria väčšinu nemocničných pacientov.

Graf č.2: Týždenné nadmerné úmrtia v DDS-kách (domovoch sociálnych služieb)

Podobne ako v predchádzajúcom grafe, aj v domovoch sociálnych služieb boli zaznamenané nadmerné úmrtia počas prvej vlny, no žiadne počas druhej vlny.

Dokonca počas druhej vlny vidíme mierne zníženie počtu úmrtí.

Zhodnotenie: Starí ľudia neumierajú počas druhej vlny pandémie vo zvýšenej miere ani v domovoch sociálnych služieb.

Graf: č.3: Týždenné nadmerné úmrtia doma (vo vlastných domoch či bytoch ľudí)

Na tomto grafe je už jasne vidieť nadmerné počty úmrtí kontinuálne od marca až po koniec októbra 2020.

Zhodnotenie: Ľudia umierajú na COVID-19 vo zvýšenej miere hlavne doma, čiže vo svojich vlastných domovoch.

Graf č.4: Týždenné nadmerné úmrtia „inde“

Uvedený graf ukazuje, že na „iných miestach“ zomieral nadmerný počet ľudí hlavne počas prvej vlny pandémie a menej, ale stále zreteľne, aj počas druhej vlny.

Zaujímavý je pokles na nulu nadmerných úmrtí počas krátkeho obdobia medzi lockdownami prvej a druhej vlny.

Zhodnotenie: Tuto ide zrejme nie o úmrtia na COVID-19, ale o samovraždy (žeby v dôsledku lockdownov?)

Grafy č.5, 6, 7 a 8: Týždenné nadmerné úmrtia podľa príčiny úmrtia

Tieto 4 grafy zobrazené naraz na obrazovke ukazujú nadmerné úmrtia podľa príčiny úmrtia na:

- Graf 5 – ischemické choroby srdca
- Graf 6 – iné príčiny
- Graf 7 – kardiovaskulárne ochorenia
- Graf 8 – cirhóza a iné ochorenia pečene

Všetky grafy vykazujú zvýšený výskyt úmrtí počas obidvoch vln pandémie.

Zhodnotenie: Tu jasne vidieť, že ľudia nadmerne počas prvej i druhej vlny pandémie neumierali na COVID-19, ale na iné choroby. Nepravdepodobnejším dôvodom boli obmedzenia bežnej zdravotnej starostlivosti.

Graf č.9: Týždenné nadmerné úmrtia podľa veku (15-44, 45-64 a 85+ rokov)

Na tomto troj-grafe vidíme, že nadmerné úmrtia sa vyskytovali počas prvej aj druhej vlny vo zvýšenej miere v mladších vekových kategóriách.

Viac v kategórii 15-44 ročných a o niečo menej v kategórii 45-64 rokov.

V kategórii starších ako 85 rokov boli nadmerné úmrtia iba počas prvej vlny, no žiadne, dokonca negatívne počas druhej vlny.

Zhodnotenie: Keďže nadmerné úmrtia v druhej vlne sú hlavne u mladších ročníkoch (15-44 rokov), musí to znamenať, že to nie sú úmrtia na COVID-19, keďže mladí na toto ochorenie neumierajú. Na akú príčinu potom zomierajú títo mladí ľudia? Pravdepodobne na následky lockdownu.

Záver

Aj vás tieto informácie šokovali?

Lockdowny ničia ekonomiku, životy a doslova majú krv na svojich rukách. A čím dlhšie trvajú, tým sú ich následky horšie.

Ak teda ľudia vo zvýšenej miere neumierajú na COVID-19, ale na následky pandemických obmedzení a lockdownov, načo ich potom pre Boha zavádzame? Veď to nedáva žiadny vedecký zmysel!

Nie práve preto, aby tam tie úmrtia boli, no neprávom sa vina zvalila na COVID-19? A aby týmto spôsobom potom vlády ospravedlňovali ďalšie lockdowny?

Ved' toto je doslova špirála do pekla! Čím viac obmedzení tým viac falošných úmrtí na COVID-19 a tým viac ďalších obmedzení.

Čo za hru tu s nami mocní hrajú? Úmyselne nás chcú šikanovať, terorizovať či nebadaj vykántriť?

Odpoveď na to si dajte sami.

Zdroj: <https://www.badatel.net/>