


CDC A FDA DÔRAZNE VARUJÚ ĽUDÍ S ALERGIAMI, ABY SA NEOČKOVALI

- CZ24 News | 29. prosince 2020



Podľa nových dát z amerického Centra pre kontrolu ochorení (CDC) sú hlásené tisíce ľudí, ktorí po podaní vakcíny na COVID-19 od firmy Pfizer nie sú schopní vykonávať bežné denné aktivity alebo si vyžadovali odborné ošetrenie.

Ide o tú istú vakcínu, ktorou sa v týchto dňoch začalo očkovať aj na Slovensku.

Tisíce ľudí po vakcíne ostali práceneschopní

K 18.12.2020 celkovo 3150 ľudí podali hlásenie, ktoré úrady označujú ako „udalosť ovplyvňujúcu zdravie“.

Všetci tí, ktorí takúto udalosť nahlásili, „nie sú schopní vykonávať bežné denné aktivity“, „nedokážu pracovať“ alebo „si vyžadujú starostlivosť lekára, prípadne iného zdravotníckeho odborníka“.

Uvedené hlásenia boli realizované prostredníctvom na to vytvorenej aplikácie v smartfónoch, ktorá využíva sms správy a webové dotazníky umožňujúce ľuďom rýchlo oznámiť vládnej agentúre CDC prípady neželaných vedľajších účinkov vakcín.

CDC ani firma Pfizer, výrobca dotknutej vakcíny, zatiaľ nereagovali na výzvy o poskytnutie ich stanoviska.

Uvedené informácie boli prezentované 19. decembra 2020 Dr. Thomasom Clarkom, epidemiológom CDC, ktorý pôsobí v *Poradnej skupine pre očkovacie praktiky*. Ide o nezávislý panel poskytujúci agentúre CDC svoje odporúčania.

Ako ďalej Dr. Clark uvádza, ku dňu 19. decembra 2020 bolo v USA celkovo podaných 272001 dávok vakcíny, čo znamená, že vážne nežiadúce účinky malo niečo vyše 1% ľudí, ktorým bola vakcína podaná.

Podľa CDC z uvedeného množstva hlásení bolo 6 prípadov anafylaktickej reakcie. Ide o vážnu alergickú reakciu, ktorá nasleduje po očkovaní, dodáva Dr. Clark.

CDC a FDA varujú ľudí s alergiami, aby sa neočkovali

Vo svojej správe agentúra CDC dôrazne upozorňuje, že ľuďom s alergiami na akúkoľvek zložku vakcíny na COVID-19 neodporúča toto očkovanie. Ľudia s inými alergiami by sa pred očkovaním mali najprv poradiť so svojim lekárom.

Zároveň každý, kto mal anafylaktickú reakciu po prvej dávke vakcíny, by už nemal ísť na druhú dávku, ktorá sa zvyčajne podáva po 3 týždňoch, upozorňuje agentúra CDC.

Podľa [Daily News](#), malo minimálne päť zdravotníkov na Aljaške negatívnu reakciu po aplikácii vakcíny od firmy Pfizer. Jeden z nich musel byť dokonca dva dni hospitalizovaný v miestnej nemocnici.

Nemocnica v štáte Illinois zasa musela [pozastaviť očkovanie](#) po tom, čo štyroch jej zdravotníkov postihli vážne reakcie po očkovaní.

Dr. Peter Marks, riaditeľ *Centra pre biologické vyhodnocovanie a výskum*, spadajúceho pod agentúru FDA pre novinárov uviedol, že spolupracujú s CDC a kolegami vo Veľkej Británii na spôsobe budúceho testovania na možné alergické reakcie.

„Budeme analyzovať dáta zo všetkých prípadov hlásených negatívnych reakcií po očkovaní v snahe presne zistiť, čo sa stalo. Tiež sa budeme snažiť pochopiť, ktoré zložky vakcíny môžu byť za tieto reakcie zodpovedné,“ dodáva Dr. Marks.

Zašpekuloval aj o tom, že jedným z možných vinníkov môže byť látka s názvom **polyetylén glykol (PEG)**, ktorá sa nachádza v nedávno schválenej vakcíne proti COVID-19 od Pfizeru.

Podľa neho, obe doteraz schválené vakcíny (od Pfizeru aj Moderny) majú „systemické vedľajšie účinky“, ktoré zvyčajne odznejú v priebehu jedného dňa.

Podľa FDA sú najbežnejšie vedľajšie účinky únava, bolesti hlavy, bolesti svalov a zimnica. Môžu mať však aj vážnejšie vedľajšie účinky.

Záver

Ľudia, ktorí podstúpia akékoľvek očkovania, by nemali hneď opúšťať zdravotnícke zariadenie, ale zotrvať v ňom aspoň po dobu 15 minút a byť monitorovaní, či sa u nich náhodou neobjaví vážna reakcia na vakcínu.

V prípade, že k takejto reakcii dôjde, prítomní zdravotníci by mali vedieť podať prvú pomoc, prípadne privolať rýchlu záchrannú pomoc. V takom prípade je potrebné ďalej monitorovať pacienta minimálne niekoľko hodín.

Zdroj: <https://www.badatel.net>