

ČEŠI PO OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU HLÁSÍ TISÍCE PROBLÉMŮ - ZDE JE PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH DLE SÚKLU, I TY VŠAK TVOŘÍ JENOM 1-2 % SKUTEČNÉHO STAVU

- CZ24 News | 9. ledna 2022

ČESKO: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na svých stránkách aktualizoval počty nahlášených podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covidu. Od prosince 2020, kdy očkování proti covidu v Česku začalo, jich ústav obdržel přes 10 tisíc. Nejčastěji jde o horečku, zimnici či únavu. Celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako možný důsledek nežádoucího účinku vakcín, je 148. SÚKL však připomíná, že jde o pouhá podezření.

„Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín. Výpis tedy slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín,“ [uvádí SÚKL na svém webu](#).

Skoro sedm tisíc lidí nahlásilo příznaky z kategorie „Celkové příznaky a reakce v místě aplikace“, kam patří kromě horečky, únavy, slabosti a bolesti v místě vpichu také třeba pocit opilosti nebo kocoviny. Kolik případů „opilosti a kocoviny“ SÚKL konkrétně zaznamenal, ústav neuvádí.

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘISPĚT

Více než tři tisíce lidí pak uvádí neurologické příznaky, jako je závrať, třes, pocit na omdlení, mdlobu, celkovou křeč či epileptický záchvat. Kolem 650 lidí po očkování trpělo nespavostí, depresemi, dezorientací či halucinacemi.

SÚKL uvádí také celkový počet úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti nemoci COVID-19. Těch je zatím 148. „Stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat souvislost příčinnou,“ připomíná ústav.

V České republice se proti covidu očkuje vakcínami, které jsou schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) i SÚKL. Zároveň je doporučuje většina českých epidemiologů i vakcinologů.

Kategorie

Počty
hlášení

Celkové příznaky a reakce v místě aplikace: Horečka, třesavka, zimnice, únava, slabost, malátnost, pocit nepohody, flu-like příznaky, otok obličeje, pocit horka, pocit chladu, nepříjemný pocit na hrudníku, bolest na hrudi, bolest v podpaží, snížená pohyblivost končetiny, zhoršení chůze nebo potíže při chůzi, selhání/neúčinnost očkování, zhoršení zdravotního stavu, snížení výkonnosti, žízeň, pocit opilosti/kocoviny, reakce v místě vpichu (bolest, zarudnutí, otok vč. velkého otoku končetiny, rezistence, teplo, svědění, zduření, modřina, brnění, vyrážka, zánět, parestezie/hypestezie v místě vakcinace).

6 862

Neurologické příznaky: Bolest hlavy, parestézie/dysestezie, mravenčení, pálivý pocit, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba, celková křeč / epileptický záchvat, narušení rovnováhy, ospalost / zvýšená spavost, letargie, snížená citlivost, obrna lícního nervu nebo periferního nervu, migréna, narušení chuti, narušení čichu, narušení paměti, narušení řeči, narušení koordinace, demence, tranzitorní ischemická ataka, globální tranzitorní amnézie, cévní mozková příhoda.

3 109

Ovlivnění svalů, kloubů nebo kostí: Bolest svalů, bolest kloubů, bolest kostí, bolest šlachy, bolest v končetině, bolest zad, bolest v křížové oblasti, bolest krku, bolest v čelisti, bolest hrudníku, bolest třísla, svalová slabost, ztuhlost, svalové spasmy, svalové záškuby, křeč svalů, bolest krku, bolest páteře, otok kloubu, ztuhnutí šije, snížení pohyblivosti, omezení hybnosti kloubu.

2 847

Ovlivnění trávicí soustavy: Nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, parestézie/hypestezie v oblasti úst, obtížné polykání, bolest při polykání, bolest břicha, otok rtu, otok jazyka, otok úst, změna barvy jazyka, bolest zubu / přecitlivělost zubů, afty, dyspepsie, říhání, refluxní choroba jícnu, sucho v ústech, krvácení z úst, břišní diskomfort, plynatost, říhání, zvýšená tvorba slin, gastritida, hemoroidy, zhoršení ulcerózní kolitidy, střevní či rektální krvácení.

1 957

Ovlivnění dýchací soustavy: Dušnost vč. dušnosti námahové, kašel, hyperventilace, zrychlené dýchání, bolestivé dýchání, výtok z nosu, bolest v krku, pocit podráždění v krku, otok hrtanu, pocit sevření hrdla, sucho v hrdle, krvácení z nosu, plicní embolie, respirační selhání, plicní edém, bronchospasmus, stridor, zhoršení astmatu, sípot, kýchání, vykašlávání krve, zánět nebo bolest vedlejších nosních dutin, alergická rýma, pleurální výpotek, porucha hlasu / ztráta hlasu.

1 325

Ovlivnění kůže a podkoží: Vyrážka, ekzém, zarudnutí, svědivost, pocení vč. nočního pocení, kopřivka, bolestivost kůže, pocit pálení kůže, petechie, angioedém, padání vlasů, puchýř, odlupování kůže, suchá kůže, mramorovaná kůže, erythema nodosum, zhoršení lupénky, akneiformní dermatitida, hyperpigmentace, fotosenzitivní reakce, kožní vaskulitida, vitiligo, purpura.

1 166

Ovlivnění cévního systému: Zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, oběhový kolaps, chladné okrajové části končetin, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps, hluboká žilní trombóza, povrchová tromboflebitida, angioedém, lymfedém, hematoma, syndrom TTS, vaskulitida, křečové žíly.

829

Ovlivnění krevního a lymfatického systému: Zvětšení a bolestivost nebo zánět lymfatických uzlin, anémie, snížený počet krevních destiček, snížená hladina fibrinogenu, imunitní trombocytopenie, zvýšený počet bílých krvinek.

717

Psychiatrické příznaky: Neklid, úzkost, nespavost, abnormální sny, podrážděnost, apatie, zmatenost, dezorientace, halucinace, deprese / depresivní nálada, výkyvy nálady, zpomalené myšlení, nervozita, tik, blouznění, sebevražedné myšlenky, strach, panická ataka, abnormální sny, noční můry, plačtivost.

652

Ovlivnění ucha a labyrintu: Závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, tinnitus, bolest ucha, otok boltce, nepříjemný pocit v uchu, narušení sluchu, hluchota, akutní vestibulární syndrom, zánět středního ucha.

641

Kategorie	Počty hlášení
Infekce: Onemocnění covidem, pneumonie, Herpes zoster, opar, rýma, infekce močových cest, zánět spojivek, sinusitida, sepse, sinusitida, zánět nosohltanu, angína, laryngitida, bronchitida, zánět kůže a podkoží, erysipel, sepse, encefalitida, epididymitida, myelitida, ječné zrno, chřipka.	640
Oční příznaky: Bolest oka / očního víčka, podráždění oka, svědění oka, světloplachost, otok oka/očního víčka, překrvení oka, zarudnutí očního víčka, blefarospasmus, ptóza očního víčka, nepříjemný pocit v oku, zánět oka, zánět duhovky, suché oko, rozmazané či narušené vidění, krátkozrakost, slepota, defekt zorného pole, mžitky, prasklá céva v oku, zvýšená tvorba slz, dvojité vidění, sklivcové krvácení, sklivcové zákalky, glaukom.	594
Ovlivnění kardiovaskulárního systému: Zrychlený tep, zpomalený tep, bušení srdce, fibrilace / flutter síní, infarkt myokardu, angina pectoris, srdeční selhání, arytmie, myokarditida, perikarditida.	531
Ovlivnění reprodukčního systému a prsou: Gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelná menstruace, opožděná menstruace, vynechání menstruace, bolestivá menstruace, silné nebo slabé menstruační krvácení, postmenopauzální krvácení, bolest nebo citlivost prsu, otok prsu, erektilní dysfunkce, poševní výtok, premenstruační syndrom, ovulační bolest, ovariální cysta.	511
Vyšetření: Zvýšená nebo snížená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak, zvýšená nebo nepravidelná srdeční frekvence, snížená saturace kyslíkem, krev v moči, snížená saturace kyslíkem, zvýšená nebo snížená glykémie, snížená hmotnost, zvýšený C-reaktivní protein.	379
Ovlivnění metabolismu: Zvýšená či snížená hladina cukru v krvi, dekompenzace diabetes mellitus, snížení chuti k jídlu, dehydratace, snížená hladina draslíku, sodíku, chloru v krvi, tetanie, úbytek hmotnosti, intolerance laktózy, abnormální hladina hormonů.	368
Poranění a procedurální komplikace: Pád, pochybení při přípravě přípravku, nevhodné dávkovací schéma, podání nesprávného přípravku, poranění hlavy.	189
Ovlivnění ledvin a močových cest: Bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, zánět močového měchýře, časté močení, krev v moči, bílkovina v moči, bolest ledviny, ledvinová kolika, močová inkontinence, nucení na močení, obtížné močení, retence moči, selhání ledvin, nápadně zbarvená moč.	182
Ovlivnění imunitního systému: Přecitlivělost, alergická reakce, anafylaktická reakce, anafylaktický šok, alergie na potraviny.	158
Ovlivnění jater a žlučových cest: Abnormální jaterní funkce, bolest jater.	21
Ovlivnění endokrinního systému: Hypotyreóza	13
Reakce hlášené v době těhotenství, šestinedělí, perinatálního období	13

[ZDROJ](#)