

ČESKÝ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV (SÚKL) VYŠETŘUJE UŽ 82 PODEZŘELÝCH ÚMRTÍ PO MRNA VAKCÍNÁCH, CO JE VŠAK PATRNĚ JENOM PŘIZNANÁ ŠPIČKA LEDOVCE. TISÍCE LIDÍ HLÁSÍ ČASTÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY - ZDE JE JEJICH PŘEHLED

- CZ24 News | 20. června 2021



ČESKO: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) eviduje už 5 693 hlášení nežádoucích účinků po aplikaci vakcíny proti covidu. Nejčastěji se jedná o bolest v místě vpichu, teploty, neurologické příznaky jako bolest hlavy či únava, bolest svalů, nevolnost nebo kašel. Úřady prověřují také 82 případů podezření na úmrtí po očkování. SÚKL upozorňuje, že pouhými podezřeními jsou všechna hlášení. Podívejte se na přehled těch nejčastějších.

K 15. červnu bylo v Česku nahlášeno 5 693 nežádoucích účinků po aplikaci vakcíny proti covidu. „Všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky. Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Mohou být také nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány,“ upozorňuje [SÚKL na](#)

[svých webových stránkách](#) s tím, že výpis slouží pouze pro přehled toho, jaké reakce byly nahlášeny.

Úmrtí, která byla nahlášena jako podezření na nežádoucí účinek vakcín, je 82. SÚKL ujišťuje, že tato úmrtí jsou důkladně posuzována v rámci ČR a následně na celoevropské úrovni farmakovigilančním výborem pro hodnocení rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), v němž má i Česko své zástupce.

Jaké jsou nejčastější nežádoucí účinky?

• Celkové příznaky a reakce v místě vpichu

Lidé hlásí například horečku, třesavku, zimnici, únavu, slabost, malátnost nebo bolest či zarudnutí v místě vpichu. Také otok obličeje, pocit horka či chladu, bolest na hrudi či žízeň.

• Neurologické příznaky

Mezi neurologické příznaky SÚKL řadí například bolest hlavy, parestézii, mravenčení, pálivý pocit, závrať, třes, pocit na omdlení, mdlobu, celkovou křeč, narušení rovnováhy či ospalost. Někteří lidé si stěžují ale i na sníženou citlivost, migrénu, narušení chuti, paměti, čichu, řeči nebo koordinace. Další očkovaní hlásili cévní mozkovou příhodu nebo ochrnutí končetiny.

• Svaly, klouby nebo kosti

Očkované často trápí i bolest svalů, kloubů, zad či bolest v končetině. Na SÚKL nahlásili i křeč svalu, bolest krku a páteře nebo zánět a otok kloubu.

• Trávicí soustava

Úřad v nežádoucích účincích vakcín eviduje i nevolnost, zvracení, průjem, obtížné polykání, bolest břicha nebo otok rtu, jazyka či úst. Lidi ale může bolet i zub, tvořit se afty nebo mohou mít zácpu.

• Dýchací soustava

Lidé jako nežádoucí účinky hlásí i dušnost, kašel, hyperventilaci, zrychlené dýchání, výtok z nosu, pocit podráždění v krku nebo otok hrtanu. Někdo krvácel z nosu, objevila se i hlášení o plicní embolii.

• Kůže a podkoží

Po aplikaci vakcíny si lidé stěžují i na vyrážku, ekzém, zarudnutí, svědivost, pocení, kopřivku, pocit pálení kůže nebo na padání vlasů.

• Cévní systém

Mezi ovlivnění cévního systému SÚKL řadí chladné okrajové části končetin, zvýšení, snížení či kolísání krevního tlaku, nával horka, zrudnutí, bledost, kolaps, hematom či syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS) u vakcíny od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson.

• Krevní a lymfatický systém

Očkovaní hlásí také zvětšení a bolestivost lymfatických uzlin, anémii či snížený počet krevních destiček.

- **Ucho a labyrint**

Přes 200 lidí označilo za vedlejší účinek vakcíny také závrať, pocit točení hlavy, pocit tlaku v uchu, bolest ucha, narušení sluchu nebo akutní vestibulární syndrom.

- **Infekce**

Mezi infekce SÚKL řadí opar, rýmu, infekci močových cest, zánět spojivek nebo infekci COVID-19 či pneumonii způsobenou virem SARS-CoV-2.

- **Oční příznaky**

Někteří očkování si stěžují i na bolest oka, rozmazané či narušené vidění, světloplachost, otok oka / očního víčka, mžitky, nepříjemný pocit v oku, dvojité vidění, prasklou cévu v oku, zánět oka, suché oko či zvýšenou tvorbu slz.

- **Psychiatrické příznaky**

Lidé jako nežádoucí účinky hlásí i neklid, úzkost, nespavost, podrážděnost, apatii, zmatenost, dezorientaci, halucinace, deprese, zpomalené myšlení, nervozitu nebo blouznění.

- **Kardiovaskulární systém**

200 lidí si stěžuje i na zrychlený či zpomalený tep, bušení srdce, fibrilaci síní, infarkt myokardu, arytmii či srdeční selhání.

- **Metabolismus**

Po očkování mají lidé údajně také zvýšenou či sníženou hladinu cukru, sníženou chuť k jídlu či jsou dehydrováni.

- **Vyšetření**

Někteří lidé mohou mít po aplikaci vakcíny pozitivní test na COVID-19, zvýšenou tělesnou teplotu či krevní tlak, zvýšenou nebo nepravidelnou srdeční frekvenci, sníženou saturaci kyslíkem nebo krev v moči.

- **Imunitní systém**

SÚKL eviduje i hlášení o ovlivnění imunitního systému, jako je přecitlivělost, alergická reakce nebo anafylaktická reakce.

- **Reprodukční systém nebo ovlivnění prsa**

Očkování hlásí například i gynekologické krvácení mimo menstruaci, nepravidelnou, opožděnou či bolestivou menstruaci, silné menstruační krvácení. Také si stěžují na bolest či otok prsu.

- **Ledviny a močové cesty**

Pár desítek lidí hlásilo po vakcíně i bolest močového měchýře, bolest v oblasti ledvin, zánět močových cest, časté močení, bolest ledviny či selhání ledvin.

- **Poranění a procedurální komplikace**

Lidé zaznamenali po očkování také pád nebo pochybení při přípravě přípravku.

- **Játra a žlučové cesty**

Deset lidí označilo za nežádoucí účinek také abnormální jaterní funkce.

Autor: Dáša Šamanová

Zdroj: <https://cnn.iprima.cz/>