


Dr. Bridle o mRNA vakcínach: SPIKE PROTEÍN MÔŽE PREKONAŤ HEMATOENCEFALICKÚ BARIÉRU A SPÔSOBIŤ POŠKODENIE MOZGU. OČKOVANÍ NESMÚ DAROVAŤ KRV, SÚ PRUDKO TOXICKÍ!

- CZ24 News | 3. června 2021



Posledné údaje z experimentov na zvieratách s mRNA vakcínou Pfizer sú naozaj desivé.

Dr. Byram W. Bridle, profesor virológie a imunológie na *University of Guelph* v Kanade v rozhovore s moderátorom rádia Alexom Piersonom varuje pred geneticky upravenými vakcínami proti COVID-19.

Bridle spolu s kolegami obdržal informácie od registračného úradu v Japonsku o testoch na zvieratách týkajúcich sa mRNA vakcíny od spoločnosti BioNTech/Pfizer. Získané údaje dokazujú, že nanočastice nezostávajú iba lokálne v mieste vpichu, vo svalovom tkanive, ako tvrdí výrobca vakcíny, ale že v niektorých prípadoch sa veľmi vysoké koncentrácie dostanú aj do iných orgánov. Zistenia z pokusov na zvieratách by mohli objasniť, prečo u očkovaných došlo k zápalu, trombózam a zástavám srdca. Všetky Bridleho tvrdenia možno overiť publikovanými článkami v

rešpektovaných vedeckých časopisoch.

Z rozhovoru vyberáme:

„Musím varovať ľudí. Informácie, ktoré sa chystám priblížiť, sú trochu strašidelné. V posledných dňoch vyšli najavo dôležité vedecké skutočnosti. Teraz už rozumieme, prečo pri tejto vakcíne vznikajú závažné pridružené komplikácie.

Vírus SARS-CoV-2 má na svojom povrchu spike proteín. S vakcínou je do organizmu dopravená časť genetického materiálu vírusu (mRNA), ktorá priamo v tele prostredníctvom ľudských buniek produkuje spike proteín, teda proteín vírusu SARS-CoV-2. Ten by mal vyvolať imunitnú odpoveď. To je teória fungovania vakcíny.

Avšak vedci zistili, že samotný spike proteín s hrotmi spôsobuje, pokiaľ sa dostane do krvi, srdcové ťažkosti, poruchy kardiovaskulárneho systému s krvácaním a trombózu (krvné zrazeniny).

Ak vstreknete vyčistený spike proteín do krvi testovaných zvierat, skutočne spôsobí všetky druhy poškodenia kardiovaskulárneho systému. Môže tiež prekonať hematoencefalickú bariéru a spôsobiť poškodenie mozgu,“ hovorí Dr. Bridle, (štúdia: [TU](#)).

Na prvý pohľad to nie je znepokojujúce, pretože vakcína sa vstrekuje iba do ramenného svalu. Doteraz sa predpokladalo, že vakcína, ako je obvyklé u bežných vakcín, zostane v ramennom svalu a iba časť proteínu bude migrovať do miestnych lymfatických uzlín, aby sa aktivoval imunitný systém.

Ale prostredníctvom žiadosti zaslanej japonskému regulačnému orgánu získal Dr. Bridle a jeho kolegovia prehľad o tom, kde a ako dlho mRNA vakcíny zostávajú v tele. A tu sa všetko komplikuje, hovorí Bridle.

Pretože vakcína Pfizer nezostáva v ramennom svalu, ale cirkuluje v krvi niekoľko dní po očkovaní.

„Hneď ako sa dostane do krvi, začne sa hromadiť v tkanivách, ako je slezina, kostná dreň, pečeň, nadobličky, a čo ma obzvlášť znepokojuje, hromadí sa vo pomerne vysokých koncentráciách vo vaječníkoch.

Práve zverejnená vedecká práca to potvrdila. Bolo vyšetrených trinásť mladých zdravotníckych pracovníkov, ktorí dostali vakcínu mRNA od spoločnosti Moderna, tiež geneticky modifikovanú vakcínu. Spike proteíny boli nájdené v krvi 11-tich z 13-tich zamestnancov.

Teraz máme jasný dôkaz o tom, že sa proteín dostáva do krvi. Viaže sa na receptory, ktoré sú na krvných doštičkách a bunkách. Keď sa to stane, môže to spôsobiť dve veci. Buď zhlukovanie krvných doštičiek alebo to vedie ku vzniku krvných zrazenín. To je dôvod, prečo sme zaznamenali poruchy zrážania krvi a krvácanie spojené s týmito vakcínami. A samozrejme je do toho zapojené srdce, dôležitá súčasť kardiovaskulárneho systému. Preto u očkovaných evidujeme problémy so srdcom. Proteín môže tiež prechádzať cez hematoencefalickú bariéru a spôsobiť neurologické poškodenie. Často vidíme smrteľné prípady z dôvodu krvných zrazenín v mozgu.

Znepokojivá je aj štúdia, ktorá potvrdzuje, že protilátky sa môžu prenášať cez materské mlieko. Cieľom matiek bolo poskytnúť dieťaťu pasívnu ochranu. Teraz sa však zistilo, že

vakcíny skutočne prenášajú svoju nosnú RNA do materského mlieka a prenášajú vektor vakcíny na dojčené deti.

Čo to znamená? Vieme, že bielkoviny sa dostanú do krvi. Všetky bielkoviny v krvi sú koncentrované v materskom mlieku. Ak sa pozrieme do databázy nežiaducich reakcií v USA, nájdeme dôkazy o gastrointestinálnom krvácaní u dojčených detí.

Ovplyvňuje to aj krvnú banku. Kanadská krvná banka momentálne dovoľuje ľuďom, ktorí boli očkovaní darovať krv. Nesmie sa to stať. Tieto patogénne bielkoviny sa prenášajú na citlivých pacientov, ktorí dostávajú krvnú transfúziu. Ovplyvňuje tiež dojčené deti. A to bude mať vážne dôsledky pre naše deti. Urobili sme veľkú chybu pri schvaľovaní týchto mRNA vakcín a nevedeli sme, že samotný spike proteín je toxín,” upozorňuje Dr. Bridle.

Doktor Bridle má vážne obavy týkajúce sa génových vakcín, napríklad ohľadom hromadenia proteínov vo vaječníkoch.

Na záver si Bridle kladie otázku: **„Budeme robiť mladých ľudí sterilnými?“**

Zdroj: <https://zemavek.sk/>