

E. Huff: NAJVYŠŠIE AMERICKÉ ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRIZNALI, ŽE PO COVIDOVÝCH “VAKCÍNACH” VZRÁSTLI OCHORENIA SRDCA 133-NÁSOBNE!

- CZ24 News | 23. června 2023

USA: Dva hlavné úrady verejného zdravotníctva v Spojených štátoch amerických vykonali spoločnú štúdiu, ktorá ukázala šokujúci nárast rizika vzniku autoimunitného srdcového ochorenia u „plne zaočkovaných“ proti Covid-19.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zistili, že v porovnaní so základným rizikom v bežnej populácii je riziko myokarditídy 133-násobne vyššie u tých, ktorí dostali mRNA „vakcíny“ od oboch hlavných výrobcov Pfizer/BioNTech a Moderna.

K štúdii publikovanej v časopise *Journal of the American Medical Association* (JAMA) prispeli výskumníci z niekoľkých špičkových univerzít a nemocníc z celej Ameriky.

Pomocou údajov z vládneho systému hlásenia nežiaducich udalostí vakcín (VAERS) dokázali CDC a FDA identifikovať 1 626 prípadov myokarditídy, ktoré boli krížovo skontrolované, aby sa zabezpečilo, že výsledky sú v súlade s oficiálnou definíciou myokarditídy CDC.

Na základe toho výskumníci dospeli k záveru, že najrizikovejšou mRNA „vakcínou“ z hľadiska potenciálnych negatívnych účinkov na zdravie je tá od Pfizer/BioNTech.

Vakcíny od Pfizeru podľa údajov zo systému VAERS spôsobili 105,9 prípadov myokarditídy na milión dávok po druhej injekcii u mužov vo veku 16 a 17 rokov. Vo vekovej skupine 12-15 rokov u mužov bolo po druhej dávke 70,7 prípadov myokarditídy na milión dávok.

Mužská veková skupina 18-24 rokov mala riziko 52,4 prípadov na milión podaných vakcín od Pfizeru a 56,3 prípadov na milión podaných vakcín od spoločnosti Moderna. Medián času od očkovania do nástupu symptómov bol len dva dni pre obe vakcíny

(Súvisiace: [Iná štúdia z Južnej Kórey](#) zistila, že prípady myokarditídy medzi plne zaočkovanými naďalej raketovo rastú.)

Kedže systém VAERS zachytáva len približne 1% poškodení vakcínou, aké je skutočné riziko autoimunitného ochorenia srdca po covidovom očkovaní?

Ako zistili predchádzajúce štúdie, prevažná väčšina srdcových problémov súvisiacich s covidovým očkovaním, približne 82%, sa vyskytuje u mužov.

Vo veľkej väčšine prípadov, okolo 96%, museli byť tí, ktorí dostali myokarditídu, hospitalizovaní a vo väčšine prípadov boli liečení nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).

V čase prepustenia zaznamenalo 87% hospitalizovaných vymiznutie symptómov, teda aspoň

spočiatku. Nedá sa však povedať, čím môžu títo ľudia trpieť v priebehu nasledujúcich rokov, najmä vo vyššom veku.

Medzi najčastejšie hlásené nežiaduce účinky patria:

- bolesť na hrudníku, tlak alebo nepohodlie (89%)
- dýchavičnosť (30%)
- abnormálne výsledky na EKG (72%)
- abnormálne srdcové nálezy na magnetickej rezonancii (72%)

Úrad CDC si uvedomuje silnú a nepopierateľnú súvislosť medzi covidovým očkovaním a ochoreniami srdca, preto spustilo program aktívneho skríningu pre dospievajúcich a mladých dospelých, aby sledovali vývoj ich zdravotného stavu po príhodách po očkovaní súvisiacich so srdcom.

Kedže covidové vakcíny sú k dispozícii len od konca decembra 2020 a do tiel ľudí sa reálne začali dostávať až v roku 2021, stále nie sú k dispozícii žiadne dlhodobé dáta na vyhodnotenie dlhodobého vplyvu očkovania na ochorenia srdca.

Organizácie *American Heart Association* (AHA) a *American College of Cardiology* (ACC) radia, aby sa ľudia s myokarditídou zdržali intenzívneho športu na 3 až 6 mesiacov, inak by mohli náhle zomrieť na ihrisku.

Až potom, keď bude mať normálne výsledky na EKG a iných testoch, by mal človek postihnutý ochorením srdca súvisiacim s covidovým očkovaním čo i len pomyslieť na obnovenie namáhavého cvičenia.

Záver

Mimochodom, VAERS zachytáva len 1% všetkých poškodení zdravia a úmrtí súvisiacich s očkovaním. Takže akokoľvek sú tieto čísla a percentá šokujúce, je potrebné ich vynásobiť číslom 100, aby sme získali presnejší obraz o skutočnom počte poškodení zdravia a úmrtí z týchto „vakcín“.

AUTOR: Ethan Huff

[ZDROJ](#)

Spracoval: Badatel.net