

Imunologická trombocytopénia - chronická choroba s rizikom smrti ako následok očkovania

- CZ24 News | 23. února 2021



New York Times dal priestor pre vyjadrenie odborníkom k úmrtiu Dr. Gregory Michaela (56), gynekológa z Floridy 15 dní po zaočkovaní proti COVID-19. Zároveň chcel zvýšiť osvetu o ochorení, na ktoré tento lekár zomrel.

Dr Jerry Spivak, expert na krvné poruchy na Univerzite Johna Hopkinsa, uviedol, že ide o „medicínsku istotu“, že vakcína od Pfizera spôsobila smrť zdravého lekára. 3 dni po očkovaní sa mu spustila imunologická trombocytopénia (ITP) a za pár dní zomrel na krvácanie do mozgu 15 dní po očkovaní. NY Times spomína aj prípad dvoch zdravých žien (72 a 48), ktoré sa po podaní vakcíny Moderna dnes liečia z ITP – choroby, ktorá vznikne, keď imunitný systém atakuje červené doštičky alebo bunky, ktoré ich vytvárajú. Prejaví sa to škvrnami a krvácaním pod kožou.

Prof. James Bussel, hematológ, ktorý napísal vyše 300 odborných článkov o rúžštepe, uviedol pre NY Times, že vakcíny môžu byť spúšťačom ITP: „Predpokladám, že niektorí ľudia majú náchylnosť, aby sa u nich rozvinula trombocytopénia. Že sa to stáva po vakcínach, je známy fakt a deje sa to aj po ďalších očkovaníach. Prečo sa to stáva, nevieme.“ Liečba ochorenia nemusí zabrať pri štandardnej terapii. Paradoxne sa týmto pacientom odporúča očkovať sa, ale pre istotu konzultovať so svojím lekárom.

Článok uvádza najmenej 36 prípadov ITP u zaočkovaných proti COVID-19 vo vládnej databáze pre hlásenie nežiaducich účinkov (z 31 mil. zaočkovaných do konca januára). V USA žije 50 000 osôb s ITP. Podľa ďalších údajov sa ITP najčastejšie vyskytuje po podaní MMR vakcíny, keď sa choroba rozvinie u približne 1 z 25 tisíc až 40 tisíc dávok vakcíny. Tiež sa objavuje po očkovaní proti hepatitíde A a B, HPV, pásovému oparu, záškrtu-tetanu-čiernemu kašľu, obrne a pneumokokom.

Podľa NY Times sa dá „všeobecne liečiť“, ale pretrvá mesiace alebo sa stane chronickým ochorením, ktoré vyžaduje lieky do konca života. V USA stojí jedna dávka lieku v priemere 2 700 USD mesačne, hoci u vážnejších prípadov je treba dávkovať dvakrát mesačne.

Pfizer potvrdil, že je si vedomý týchto prípadov a že zbiera k nim informácie. Hneď po medializácii úmrtia Dr. Michaela však Pfizer vyhlásil, že „niet náznaku – ani z klinických skúšok ani medzi ľuďmi, ktorí dostali vakcíny od začiatku očkovania, že by to bolo spojené s trombocytopeniou.“ Podobne sa vyhovára Moderna „nevieme potvrdiť súvislosť“. Stavím sa, že naši lekári alebo ministerskí odborníci by určite rovnako súvislosť očkovania a tejto choroby popreli. Otázne je, aké je povedomie u lekárskej profesie všeobecne (aj v USA) o tomto probléme, lebo to môže byť aj príčinou, prečo je takých prípadov po očkovaní nahlasovaných minimálne.

AUTOR: Ing. Jana Ray Tutková, M. A. je ekonómka s postgraduálom z európskej politiky, ktorá vedie Centrum pre bioetickú reformu

Zdroj: <https://zemavek.sk/>