

Jon Rappoport: Byl to masakr. Nová studie o úmrtích po mRNA Covid “očkování”

- CZ24 News | 21. listopadu 2023

SVĚT: Studie:

Souvislosti a cíle: Od zveřejnění úspěšných výsledků klinických studií mRNA vakcín proti koronaviru 2019 (COVID-19) v prosinci 2020 se objevilo několik zpráv o kardiovaskulárních komplikacích po očkování mRNA. Tato studie podrobně popisuje různé kardiovaskulární nežádoucí příhody hlášené po první nebo druhé dávce mRNA vakcín, včetně perikarditidy/myoperikarditidy, myokarditidy, hypotenze, hypertenze, arytmie, kardiogenního šoku a cévní mozkové příhody, infarkt myokardu/STEMI, intrakraniální krvácení, trombózu (hluboká žilní trombóza, mozková žilní trombóza, arteriální nebo žilní trombotické příhody, trombóza portální žíly, koronární trombóza, mikrovaskulární trombóza tenkého střeva) a plicní embolii.

Metody: Byl proveden systematický přehled původních studií uvádějících potvrzené kardiovaskulární projevy po očkování COVID-19. V souladu s pokyny PRISMA byly prohledány elektronické databáze (PubMed, PMC NCBI a Cochrane Library) do ledna 2022. Z relevantních studií byly získány základní charakteristiky pacientů a výsledky onemocnění.

Výsledky: Celkem 81 článků analyzovalo potvrzené kardiovaskulární komplikace po očkování mRNA vakcínou COVID-19 u 17 636 osob a zaznamenalo 284 úmrtí s jakoukoli mRNA vakcínou. Ze 17 636 kardiovaskulárních příhod s jakoukoli mRNA vakcínou bylo 17 192 pozorováno u vakcíny BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), 444 příhod u mRNA-1273 (Moderna). U jakékoli mRNA vakcíny byla často hlášena trombóza ($n = 13\,936$), dále cévní mozková příhoda ($n = 758$), myokarditida ($n = 511$), infarkt myokardu ($n = 377$), plicní embolie ($n = 301$) a arytmie ($n = 254$). Stratifikace výsledků podle typu vakcíny ukázala, že trombóza (80,8 %) byla častá v kohortě BNT162b2, zatímco cévní mozková příhoda (39,9 %) byla častá u mRNA-1273 u jakékoli dávky. Doba mezi dávkou vakcíny a nástupem prvního příznaku byla u vakcíny mRNA-1273 v průměru 5,6 dne a u vakcíny BNT162b2 4,8 dne. V kohortě s vakcínou mRNA-1273 bylo zaznamenáno 56 úmrtí ve srovnání s 228 úmrtími u vakcíny BNT162b2, zatímco ostatní byli propuštěni nebo přeloženi na jednotku intenzivní péče.

Na svém Substacku dr. [Peter McCullough, MD](#), který studii komentuje, píše: „Mějte na paměti, že obvykle [méně než] 50 úmrtí u široce používaného, nového výrobku vede k celosvětovému stažení z trhu. V lékařské literatuře je 284 dobře popsanych úmrtí v důsledku kardiovaskulárních nebo trombotických komplikací závažným zjištěním u výrobků, které jsou stále na trhu a jsou propagovány agenturami veřejného zdraví po celém světě.“

V roce 1976, kdy bylo proti údajné prasečí chřipce očkováno 25 % americké populace a v důsledku očkování došlo k 32 úmrtím – číslo 32 bylo v té době CDC nepochybně považováno jako „příliš vysoké“ – byl celý očkovací program zastaven a zrušen.

Tradiční lékařské myšlení o úmrtích souvisejících s očkováním bylo: Pokud vidíme několik úmrtí,

znamená to, že jich je mnohem více, které nevidíme.

Ted' ne.

Nyní je to: nacpat injekci do co největšího počtu rukou, co nejvíce skrývat poškození a úmrtí, neustále tvrdit, že vakcína je bezpečná a účinná, a cenzurovat proti-informace. Pokud je to možné, očkování nařídít.

Dnes si většina lékařů uvědomuje, že ve skutečnosti pracují pro farmaceutický průmysl, který zase ovládá zpravodajství a spolčuje se s federální vládou, aby veřejnosti vnutil co nejvíce léků a vakcín. Tito lékaři se neptají. Vykašlali se na svou přísahu, že především neublíží, a pobírají výplaty.

Poškození a úmrtí způsobená jejich výrobky jsou ignorována. Lékaři.

Můžete tomu říkat kumpánský kapitalismus nebo medicína prostřednictvím socialismu. Je jedno, jak to nazvete.

Je to vražda.

AUTOR: Jon Rappoport

PŘEKLAD: David Formánek/Otevri Svou mysl

[ZDROJ](#)