

L. D. Johnson: 100 000 „COVIDOVÝCH ÚMRTÍ“ V USA SPÔSOBILO ZLYHANIE OBLIČIEK VYVOLANÉ REMDESIVIROM.

Používajú naraz viac nástrojov pre genocídu a depopuláciu

- CZ24 News | 19. března 2023

Za posledné tri roky približne 100 000 úmrtí na Covid-19 v Amerike možno pripísať zlyhaniu obličiek, ktoré vyvolal toxický liek remdesivir.

Tento odhad bol extrapolovaný z vyšetrovania Johna Beaudoina v štáte Massachusetts, ktorý skúmal príčiny smrti na jednotlivých úmrtných listoch pred a počas škandálu s covidom.

Beaudoin podal žiadosť na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám a dostal všetky úmrtné listy v Massachusetts od roku 2015 do roku 2022. Po analýze všetkých údajov o príčinách úmrtí Beaudoin zistil, že len v Massachusetts bolo od 1. januára 2021 do 30. novembra 2022 až 1840 nadmerných úmrtí na akútne zlyhanie obličiek.

Verí, že tieto nadmerné prípady akútneho zlyhania obličiek sú výsledkom nariadeného nemocničného protokolu, ktorý používal vysoko toxický liek remdesivir.

Jeho analýza dokonca nezahrňa riziko srdcových príhod spôsobených remdesivirom, čo je ďalší vážny vedľajší účinok „lieku“ zistený Európskym systémom hlásenia spontánnych nežiaducich udalostí.

John Beaudoin preto výzva na spustenie kriminálneho vyšetrovania.

Remdesivir spôsobuje smrteľné poškodenia orgánov

V máji 2020 americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) povolil americkým nemocniciam používať neúspešný liek proti eboly s názvom remdesivir (obchodná značka Veklury).

Tento „liek“ sa ukázal ako najmenej účinný a najsmrteľnejší prostriedok liečby eboly vo veľkej štúdii z roku 2019. FDA napriek tomu ho plne schválil v októbri 2020. V štúdii mal remdesivir najvyššiu mieru úmrtnosti, vyššiu ako 50% pacientov!

Okrem toho, veľká štúdia na amerických vojnových veteránoch zistila, že liečba remdesivirom „nepriniesla žiadne zlepšenie prežitia, ale bola spojená s dlhšími pobytmi v nemocnici“.

Aj keď liek spôsobuje vysokú mieru zlyhania obličiek, nakoniec mu bolo udelené plné schválenie pre pediatrické prípady Covid-19 a dnes je stále primárnou liečbou covidových diagnóz v nemocniciach.

Podľa štúdií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) remdesivir zvyšuje riziko zlyhania obličiek 20-násobne! Dokonca ani WHO neodporúčala používanie remdesiviru na Covid-19 už v novembri 2020, no americké, aj naše nemocnice naďalej pumpujú tento toxín do pacientov.

Je smutné, že WHO nakoniec znovu odporučila remdesivir u pacientov s miernym alebo stredne

ťažkým covidom, ktorí sú vystavení vysokému riziku hospitalizácie. Keď sú pacienti izolovaní od svojich rodinných príslušníkov, zbytočne utlmení sedatívami a napojení na pľúcne ventilátory, negatívne účinky remdesiviru sa znásobujú.

Bez ohľadu na to, aký smrteľný je tento „liečebný“ protokol, je to protokol, ktorý zabezpečil nemocniciam extra finančný príjem počas núdzového stavu. Je to protokol, ktorý pripravil pôdu pre núdzové použitie mRNA vakcín tým, že dodal „úmrtia na Covid-19“.

Sadisticky, nemocnice naďalej požívajú imunitu pred zodpovednosťou, ktorá pokrýva ich dokázateľne škodlivé „liečebné“ protokoly a očkovačie programy.

Remdesivir bol pretláčaný kvôli klinickému podvodu

Počas núdzového stavu v súvislosti s ochorením Covid-19 dostali nemocnice imunitu. Boli im tiež vyplácané finančné stimuly za uvedenie Covid-19 ako príčiny smrti na úmrtných listoch. Základné faktory a iatrogénne chyby, ktoré viedli k týmto úmrtiam, boli ignorované a ignorujú sa dodnes.

Dr. Anthony Fauci (americký Mikas) a Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby (NIAID) zmenili indikáciu (účel použitia) remdesiviru po tom, čo zlyhal pri liečbe eboly. NIAID tiež manipuloval s primárnymi a sekundárnymi cieľmi štúdií s remdesivirom pre Covid-19, aby zakryl nepriaznivé zistenia a falošne ho propagoval ako antivírusový liek na Covid-19.

Poznámka redakcie: Tieto odporúčania samozrejme hneď prebralo aj slovenské ministerstvo zdravotníctva pod vedením bývalého ministra Krajčího, ktoré remdesivir zaviedlo do slovenských liečebných protokolov v októbri 2020. Remdesivir výrazne propagovala aj známa covidová celebrita, profesor Jarčuška.

Spočiatku bolo primárnym cieľom štúdie „vyhodnotiť účinnosť rôznych skúmaných terapeutík v porovnaní s kontrolnou skupinou u dospelých klinicky hospitalizovaných s Covid-19. Toto sa počas štúdie zmenilo, aby sa vypočítal „čas do zotavenia na 29. deň“.

Sekundárnymi cieľmi štúdie bolo spočiatku „vyhodnotiť klinickú účinnosť rôznych skúšaných terapeutík v porovnaní s kontrolnou skupinou podľa klinickej závažnosti, hospitalizácie a mortality a zhodnotiť bezpečnosť rôznych skúšaných terapeutík v porovnaní s kontrolnou skupinou“.

Neskôr však tieto ciele boli zmenené na „zhodnotiť zlepšenia zdravotného stavu súvisiace s liečbou na 8-bodovej poradovej škále v 15. deň“. Inými slovami, bezpečnosť a účinnosť nebola nikdy preukázaná, ale liek bol aj tak pretlačený do používania verejnosťou.

Lekárske chyby sú 3. najčastejšia príčina úmrtia v zdravotníctve

V roku 2016 výskumný tím Univerzity Johnsa Hopkinsa zistil, že lekárske chyby boli treťou najčastejšou príčinou smrti s počtom 250 000 úmrtí ročne len v USA.

Tím vedcov varoval, že spôsob, akým zdravotnícke úrady zbierajú národné zdravotnícke štatistiky, zlyhal pri klasifikácii a uvádzaní lekárskeho pochybení v úmrtnom liste pacientov.

Výskumníci sa zasadujú za aktualizáciu oficiálnych kritérií na klasifikáciu úmrtí na úmrtných listoch. Táto aktualizácia je zúfalo potrebná, pretože zlyhanie obličiek vyvolané remdesivirom sa javí ako vážny problém medicínskeho pochybenia v celom zdravotníckom systéme.

V každom prípade sa musí tento prudký nárast nadmernej úmrtnosti na akútne zlyhanie obličiek prešetriť.

Záver

Kedže používanie remdesiviru naďalej pokračuje, veľkú časť súčasných úmrtí na Covid-19 možno najlepšie opísať ako premyslenú úkladnú vraždu.

Platí to o to viac, keď vezmeme do úvahy skutočnosť, že úrady zmanipulovali klinické skúšky a v roku 2019 veľmi dobre vedeli, že remdesivir nie je liek, ale nebezpečný jed.

[ZDROJ](#)

AUTOR: Lande D. Johnson

Zpracoval: Badatel.net