

L. D. Johnson: Vedci zistili, že covidové vakcíny spôsobili nórske deťom rozsiahle poškodenia, vrátane anafylaxie, myokarditídy, opuchnutých uzlín a apendicitídy

- CZ24 News | 11. ledna 2024

SVET: Celoštátna štúdia z Nórska založená na zdravotných registroch skúmala výskyt 18 nežiaducich udalostí u dospelých detí po podaní dvoch mRNA vakcín proti Covidu-19.

„Vakcíny“ licencované v Nórsku boli Comirnaty (BNT162b2, Pfizer-BioNTech) a Spikevax (mRNA-1273, Moderna). Tieto vakcíny boli aplikované deťom vo veku 12 až 19 rokov už v apríli 2021. Vakcíny boli aplikované aj „vysoko rizikovým“ deťom pred aprílom, ale tieto deti boli zo štúdie vylúčené. Do štúdie bolo zahrnutých takmer 500 000 detí.

Zdravé nórske deti trpia kvôli neúspešnému očkovaciemu programu vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna

Podľa štúdie tieto zbytočné a podvodné vakcíny spôsobili rozsiahle škody zdravým dospelým deťom. Najpozoruhodnejšie nežiaduce reakcie boli anafylaxia, myokarditída, perikarditída, [lymfadenopatia](#) (zdurenie lymfatických uzlín) a apendicitída (zápal slepého čreva).

V samostatnej čiastkovej analýze výskumníci zistili, že covidové vakcíny tiež spôsobili nárast epilepsie a krčov u detí. Vakcínové poškodenia zdravia boli rozsiahlejšie po druhej dávke, čo naznačuje, že kumulatívna toxicita sa môže vyskytnúť z jednej dávky na druhú.

Zo štúdie boli vylúčené deti, ktoré trpeli niektorým z 18 skúmaných zdravotných problémov počas štyroch rokov pred očkovaním proti covidu. To znamená, že poškodenie vakcínami u nie celkom zdravých detí nebolo v štúdii ani len zaznamenané.

Poškodenie vakcínami by sa zrejme ukázalo ešte väčšie, ako bolo zaznamenané v tejto štúdii. Covidové vakcíny mohli spôsobiť, že nezdravé deti sú na tom dnes ešte horšie ako predtým.

Ďalším obmedzením štúdie bolo vynechanie všetkých detí, ktorým boli podané tri dávky vakcíny, alebo detí, ktoré dostali inú ako mRNA vakcínu (napríklad AstraZeneca alebo Johnson&Johnson).

Zo štúdie boli tiež vyradené deti, ktoré zomreli počas obdobia štúdie.

Anafylaxia 10-krát vyššia u očkovaných detí

Výskumníci použili takzvanú analýzu samokontrolovaných sérií prípadov (SCCS) a model známy ako Poissonova regresia na hľadanie nárastu nežiaducich udalostí medzi očkovanými a neočkovanými deťmi. Neočkované deti boli v štúdii použité ako referenčný bod (kontrolná skupina).

Vedci zistili, že deti očkované vakcínou proti Covidu-19 mali 5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že utrpia anafylaktickú reakciu (ťažký alergický šok v krátkom čase po zaočkovaní).

Po druhej dávke vakcíny sa riziko anafylaxie zvýšilo takmer desaťnásobne. Rizikové okno pre

anafylaktický šok je len dva dni po podaní vakcíny. Ide o medicínsky štandard stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Riziko anafylaktického šoku u detí by bolo zrejme ešte vyššie, ak by sa rizikové okno rozšírilo na 14 dní po očkovaní.

Pri mRNA vakcínach sa hrotový proteín nemusí v tele prejavíť okamžite. Môže sa replikovať a hromadiť vo vzdialených orgánoch (vrátane srdca) niekoľko týždňov po očkovaní. To môže spôsobiť ďalšie nežiaduce reakcie dlho po úvodnom dvojdnovom rizikovom okne stanovenom WHO.

Myokarditída 7-krát vyššia u očkovaných detí

Rizikové okno pre lymfadenopatiu bolo stanovená na 14 dní po očkovaní. U očkovaných detí bola v tomto časovom období 2,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť opuchnutými lymfatickými uzlinami. Toto je indikátor budúceho rizika rakoviny.

Najviac šokujúce však bolo, že očkované deti mali 7-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú trpieť myokarditídou alebo perikarditídou v rámci 28-dňového rizikového okna po druhej dávke covidovej vakcíny.

Toto sa dá charakterizovať ako zneužívanie detí a zanedbanie lekárskej starostlivosti, čo predstavuje zločin proti deťom v celosvetovom meradle!

V doplnkovej analýze vedci zistili zvýšené riziko akútnej apendicitídy (zápalu slepého čreva) po prvej aj druhej dávke vakcíny. Po očkovaní došlo aj k výraznému zvýšeniu obrny tvárového nervu.

Ďalšie čiastkové analýzy zistili zvýšené riziko epilepsie a krčv u 18- a 19-ročných v rámci 28-dňového rizikového okna po druhej dávke.

Záver

„Znalosť potenciálnych nežiaducich účinkov po očkovaní je rozhodujúca pre zváženie prínosov a rizík a pre budúce odporúčania očkovania,“ napísal German Tapia z Nórskeho inštitútu verejného zdravia.

Dost suché konštatovanie. Podľa nášho názoru by takéto katastrofálne výsledky štúdie mali znamenať okamžité začatie kriminálneho vyšetrovania a uväznenie všetkých štátnych a zdravotníckych predstaviteľov, ktorí sa podieľali na covidovej očkovacej kampani. A nielen v Nórsku, ale na celom svete!

AUTOR: Lance D. Johnson

Překlad: Badatel

[ZDROJ](#)