

MRNA PSEUDO-OČKOVANIE SPÔSOBUJE SYNDRÓM IMUNITNÉHO OSLABENIA - VAKCÍNOVÝ AIDS

- CZ24 News | 22. února 2022

Čoraz viac závažných indícií poukazuje na to, že mRNA vakcíny spôsobujú v organizme syndróm imunitného oslabenia: Vaccine **A**cquired **I**mmune **D**eficiency **S**yndrome (Vakcínový AIDS). Na základe súčasných poznatkov možno povedať, že tento syndróm by v priebehu mesiacov alebo dokonca aj rokov mohol u zaočkovaných proti korone zapríčiniť ďalšie ochorenia.

AIDS znamená oslabenie aktivít imunitného systému, ktoré môže byť u niekoho slabšie u iného silné. Príčinou je použitie gén-techniky - mRNA. Základom takéhoto očkovania je, že pri vakcínovaní sa musí mRNA dostať do buniek, a to funguje len tak, že je potrebné imunitný systém takpovediac oklamať a či vytrikovať.

To sa robí napríklad pomocou lipidových partiklov, do ktorých je zabudovaná mRNA.

I nejmenší finanční příspěvek velice pomáhá! Děkujeme!

CHCI PŘISPĚT

Dôležité je podotknúť, že AIDS ako taký nie je žiadnou chorobou. Avšak keď boli zablokované dôležité časti imunitného systému, tak vírusy a patogénne baktérie majú ľahkú prácu pri vyvolaní rôznych chorôb organizmu.

Expert Florian Schilling z Mníchova má veľmi dobré znalosti, čo všetko môže spôsobiť vakcínový AIDS:

Strata funkcie K-buniek, vypadnutie funkcie interferónového systému, oslabenie činnosti pomocných T-buniek, genetické preprogramovanie obranných buniek.

Schilling sa vo svojej expertíze zmiňuje o jednej štúdii, ktorá skúmala následky očkovania mRNA u veľkej skupiny probantov. Až u 6 percent z nich boli zistené také protilátky, ktoré zosilňovali infekcie.

Meranie počtu K-buniek, interferónu (proteín, ktorý má stimulujúci účinok na imunitný systém), Th1, Th2 a ďalších parametrov ukázalo zarážajúco nízke hodnoty. Naproti tomu bol počet T-buniek nebezpečne vysoký.

To všetko svedčí o hroziacom veľkom nebezpečenstve negatívnych následkov pre očkovaných.

Sledujte nás na Telegramu: t.me/cz24news

AUTOR: Roman Bednár

[ZDROJ](#)