


MRNA Vakcíny: Americké CDC potvrzuje, že USA v roce 2021 zaznamenaly 338násobný (!!!) nárůst oznámení nemocí souvisejících s AIDS a rakovinou

- CZ24 News | 8. října 2022

A opět je zde téma, které mainstream vůbec nezajímá. Přitom informace přichází z oficiálních míst - přímo z americké CDC a jasně naznačují souvislost genových injekcí se zvýšeným výskytem rakoviny i nemocí souvisejících se zhroucením imunity - AIDS.

Oficiální údaje poskytnuté vládou USA a Centers for Disease Control silně naznačují, že u plně očkovaných Američanů se může vyvinout syndrom získané imunodeficience nebo podobná nemoc, která decimuje vrozený imunitní systém.

Nejsou však sami, protože další údaje poskytnuté vládou Spojeného království a Kanady naznačují, že u očkované populace v těchto dvou zemích se také rozvíjí tato vysilující nemoc.



Je běžnou mylnou představou, že syndrom získané imunodeficiency (AIDS) je způsoben pouze virem HIV. To prostě není pravda.

Získaná (nebo sekundární) imunodeficiencie je hlavním příčinou infekce u dospělých. Tato

imunodeficitní onemocnění částečně nebo úplně narušují imunitní systém, čímž se tělo stává snadným cílem pro různé nemoci a infekce. ([zdroj](#))

Když imunitní deficit postihne imunitní systém, tělo již nemůže bojovat s bakteriemi a nemocemi. ([zdroj](#))

Sekundární imunodeficitní onemocnění mohou způsobit různé faktory prostředí. ([zdroj](#))

Některé z nich jsou běžné:

- Radiace nebo chemoterapie, které mohou vést k sekundární imunitní nedostatečnosti zvané neutropenie
- Infekce virem lidské imunodeficiency (HIV) může vést k syndromu získané imunodeficiency (AIDS).
- Leukémie, rakovina, která začíná v buňkách kostní dřeně a může vést k hypogamaglobulinémii – typu sekundární imunitní nedostatečnosti
- Podvýživa, která postihuje až 50 % populace v nerozvinutých zemích a činí lidi náchylnými k infekcím dýchacích cest a průjmovým onemocněním

Mezi méně časté příčiny však patří **léky**. ([zdroj](#))

Je tedy možné, že lék spustí syndrom získané imunodeficiency a údaje zveřejněné vládou USA a Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) silně naznačují, že by se injekce Covid-19 měly dostat na tento seznam.

Oficiální údaje ze Spojeného království a Kanady po měsíce naznačovaly, že se u očkované populace rozvíjí nová forma AIDS. Důvodem je, že injekce Covid-19 se v praxi ukazují jako negativní, což znamená, že poškozuji přirozený imunitní systém.


Níže uvedená tabulka ukazuje počet případů na 100 000 obyvatel v Anglii, rozdělený podle stavu očkování, od 51. týdne v roce 2021 do 12. týdne v roce 2022

	Cases reported by specimen date between week 51 2021 (w/e 26/12/21) and week 02 2022 (w/e 16/01/22)		Cases reported by specimen date between week 3 2022 (w/e 23 January 2022) and week 6 2022 (w/e 13 February 2022)		Cases reported by specimen date between week 9 2022 (w/e 6 March 2022) and week 12 2022 (w/e 27 March 2022)	
			[see		[see	
	Unadjusted rates among persons vaccinated with at least 3 doses (per 100,000)	Unadjusted rates among persons not vaccinated (per 100,000) ^{1,2}	Unadjusted rates among persons vaccinated with at least 3 doses (per 100,000)	Unadjusted rates among persons not vaccinated (per 100,000) ^{1,2}	Unadjusted rates among persons vaccinated with at least 3 doses (per 100,000)	Unadjusted rates among persons not vaccinated (per 100,000) ^{1,2}
Under 18	2,295.7	3,990.1	1,637.8	4,529.9	1,454.0	1,711.7
18-29	3,460.5	3,853.3	3,294.6	1,495.1	3,118.8	941.6
30-39	3,857.1	3,251.7	4,579.1	1,652.1	4,324.7	1,085.6
40-49	4,012.4	2,573.9	4,416.0	1,442.9	3,957.8	955.3
50-59	3,995.9	2,133.3	2,458.4	937.3	3,303.4	779.8
60-69	3,070.0	1,499.8	1,685.2	652.3	2,814.9	572.8
70-79	2,062.8	1,129.7	1,129.6	520.0	2,161.5	532.1
≥80	1,842.6	1,374.8	1,268.0	831.7	2,023.7	775.6

[zdroj](#)

Počty případů na 100 000 obyvatel byly během těchto tří měsíců nejvyšší u trojnásobně očkované populace, s výjimkou 18-29letých ve zprávě ze třetího týdne a mladších 18 let ve všech třech měsících.

Nyní, když známe počty případů, můžeme použít jednoduchý vzorec účinnosti vakcíny společnosti Pfizer k výpočtu skutečné účinnosti vakcíny Covid-19 u trojnásobně očkovaných.



To se poněkud liší od toho, jak Pfizer uváděl 95% účinnost, že? Nebo jen zapomněli říct, že je třeba dát k 95 záporné znaménko?

Účinnost vakcíny však ve skutečnosti není měřítkem vakcíny, ale spíše měřítkem výkonnosti imunitního systému očkované osoby ve srovnání s výkonem imunitního systému neočkované osoby.


Pomocí čísel případů poskytnutých UKHSA můžeme také vypočítat výkon imunitního systému; zde je graf ukazující, jak se porovnávají –

Triple Vaccinated Population Immune System Performance VS Natural Immune System Performance of the Unvaccinated

Week 51 2021 to Week 12 2022

Source: UKHSA Vaccine Surveillance Reports, Week 3 + 7 + 13

— 18-29 — 30-39 — 40-49 — 50-59 — 60-69 — 70-79 — 80-89




[Zde](#) si můžete přečíst kompletní přezkoumání údajů Spojeného království .

Údaje kanadské vlády také ukazují zajímavé skutečnosti. Níže uvedený graf ukazuje skutečnou účinnost vakcíny Covid-19 v Kanadě z hlediska infekcí, hospitalizací a úmrtí –

Real-World Covid-19 Vaccine Effectiveness (%) against Infection/Hospitalisation/Death in Canada 21st March to 10th April 2022

Source: Government of Canada Covid-19 Daily Epidemiology Update



Kompletní prozkoumání kanadských dat si můžete přečíst [zde](#).

Údaje z Velké Británie a Kanady samozřejmě pouze naznačují, že zde existuje vážný problém, nemusí nutně znamenat, že se to přenáší do nemocí a stavů spojených se syndromem získané imunodeficiency.

Americká CDC provozuje systém hlášení nežádoucích účinků vakcín, kde mohou být hlášeny nežádoucí reakce na vakcíny. Kompletní databázi naleznete [zde](#).

Databáze obsahuje nežádoucí reakce na všechny vakcíny dostupné v USA od roku 1950. Prohledali jsme databázi běžných onemocnění a infekcí spojených se syndromem získaného selhání imunity a zjistili jsme následující.

CDC má užitečnou stránku se seznamem „oportunních infekcí spojených s AIDS“, kterou si můžete prohlédnout [zde](#). Zde je výňatek ze seznamu -

Cytomegalovirus (CMV)	• CMV can infect multiple parts of the body and cause pneumonia, gastroenteritis (especially abdominal pain caused by infection of the colon), encephalitis (infection) of the brain, and sight-threatening retinitis (infection of the retina at the back of eye). • People with CMV retinitis have difficulty with vision that worsens over time. CMV retinitis is a medical emergency because it can cause blindness if not treated promptly.
Encephalopathy, HIV-related	• This brain disorder can occur as part of acute HIV infection or can result from chronic HIV infection. • Its exact cause is unknown, but it is thought to be related to infection of the brain with HIV and the resulting inflammation.
Herpes simplex virus (HSV)	• HSV is a common virus that causes no major problems for most people. • HSV is usually acquired sexually or passed from mother-to-child during birth. • In most people with healthy immune systems, HSV is usually latent (inactive). • Stress, trauma, other infections, or suppression of the immune system, (such as by HIV), can reactivate the latent virus and symptoms can return. • HSV can cause painful cold sores (sometime called fever blisters) in or around the mouth, or painful ulcers on or around the genitals or anus. • In people with severely damaged immune systems, HSV can also cause infection of the bronchus (breathing tube), pneumonia (infection of the lungs), and esophagitis (infection of the esophagus, or swallowing tube).

[zdroj](#)

A zde je seznam rakovin oficiálně označených jako „rakoviny definující AIDS“.

What are AIDS-related cancers?

People living with HIV are much more likely to get certain types of cancer than people without HIV. Certain kinds of cancer are called AIDS-defining cancers or AIDS-defining malignancies. This means when people with HIV develop one of them, their HIV infection has progressed to AIDS. AIDS-defining cancers are:

- Kaposi sarcoma
- Aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL)
- Cervical cancer

[zdroj](#)

Existuje neuvěřitelně dlouhý seznam nemocí spojených s AIDS, takže jsme vybrali následující -

- Rakoviny definující AIDS
- herpetická infekce
- Získané poruchy imunity včetně syndromu získané imunodeficiencie
- Encefalopatie (onemocnění mozku spojené s AIDS)
- Bakteriální/houbové infekce spojené s AIDS (kandidóza, kokcidioidomykóza, kryptokokóza)
- sepse
- myokarditida a perikarditida

Myokarditida a perikarditida nejsou oficiálně spojeny s AIDS, ale jsou autoimunitními chorobami, které jsou výsledkem útoku imunitního systému na srdce. A protože tyto dva stavy patří k jediným vedlejším účinkům vakcíny Covid-19 hlášeným regulátory léčiv, zaslouží si bližší kontrolu.

Nejprve jsme provedli pátrání po rakovinách definujících AIDS, které vykazovaly vedlejší účinky. Pak jsme hledali vedlejší účinky všech vakcín podle roku a poté vedlejší účinky injekcí Covid-19.

Zde je návod, jak CDC zobrazuje výsledky:

Messages:

- VAERS data in CDC WONDER are updated every Friday. Hence, results for the same query can change from week to week.
- These results are for 1,127 total events.
- Rows with zero Events Reported are hidden. Use Quick Options above to show zero rows.

Year Reported ↓	Events Reported ↑↓	Percent (of 1,127) ↑↓
1955	1	0.09%
1990	1	0.09%
1991	1	0.09%
1993	2	0.18%
1994	4	0.35%
1995	2	0.18%
1996	1	0.09%
1997	4	0.35%
1999	5	0.44%
2000	7	0.62%
2001	7	0.62%
2002	8	0.71%
2003	3	0.27%
2004	7	0.62%
2005	12	1.06%
2006	3	0.27%
2007	5	0.44%
2008	24	2.13%
2009	23	2.04%
2010	29	2.57%
2011	21	1.86%
2012	21	1.86%
2013	27	2.40%
2014	31	2.75%
2015	19	1.69%
2016	32	2.84%
2017	41	3.64%
2018	46	4.08%
2019	42	3.73%
2020	39	3.46%
2021	430	38.15%
2022	222	19.70%
Unknown Date	7	0.62%
Total	1,127	100.00%

Note: Submitting a report to VAERS does not mean that healthcare personnel or the vaccine caused or contributed to the adverse event (possible side effect).

Messages:

- VAERS data in CDC WONDER are updated every Friday. Hence, results for the same query can change from week to week.
- These results are for 603 total events.
- Rows with zero Events Reported are hidden. Use Quick Options above to show zero rows.

Year Reported ↓	Events Reported ↑↓	Percent (of 603) ↑↓
2021	385	63.85%
2022	217	35.99%
Unknown Date	1	0.17%
Total	603	100.00%


Note: Submitting a report to VAERS does not mean that healthcare personnel or the vaccine caused or contributed to the adverse event (possible side effect).

[Top](#) [Options](#) [Notes](#) [Citation](#) [Query Criteria](#)

Získali jsme výsledky zobrazené CDC, abychom vytvořili vlastní grafy, které jsou srozumitelnější. Proto nebudeme zobrazovat verzi výsledků CDC pro další nemoci související s AIDS. Ale nezapomeňte, že výsledky si můžete sami ověřit na stránce CDC Wonder [zde](#).

Níže uvedený graf ukazuje počet běžných druhů rakoviny obvykle spojených s AIDS, které hlásily VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle

roku, ve kterém byly hlášeny, a pouze pro vakcíny Covid-19:




Jak můžete vidět, v letech 2021 a 2022 došlo k obrovskému nárůstu zpráv, přičemž velká většina byla způsobena injekcemi Covid-19.

Průměrný počet běžných případů rakoviny souvisejících s AIDS hlášených jako nežádoucí příhoda vakcíny v letech 2000 až 2020 je 21,3.

Celkový počet běžných druhů rakoviny souvisejících s AIDS hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 430, což představuje nárůst o 1919 %.

Je však důležité vědět, že ne všechny nežádoucí účinky jsou hlášeny VAERS. Ve skutečnosti CDC připustilo, že pouze 1% až 10% vedlejších účinků je skutečně hlášeno systému. Nicméně brilantní analýza Jessicy Rose, Phd, přesně odhaduje podhodnocení na nejméně 41,3. [Viz zde](#) .

Níže uvedený graf ukazuje počet získaných poruch imunity, včetně AIDS, hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle roku, kdy byly hlášeny:




V letech 2021 a 2022 opět došlo k obrovskému nárůstu zpráv, přičemž velká většina je způsobena injekcemi Covid-19.

V letech 2000 až 2020 bylo hlášeno průměrně 31 získaných poruch imunity jako nežádoucí účinky vakcíny.

Celkový počet získaných poruch imunity hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 386, což představuje nárůst o 1145 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet herpetických infekcí/komplikací hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělený podle roku, kdy byly hlášeny:




Opět obrovský nárůst v letech 2021 a 2022.

Průměrný počet herpetických infekcí hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 926.

Celkový počet herpetických infekcí hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 18 336. To odpovídá nárůstu o 1880 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů encefalopatie hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělený podle roku, kdy byly hlášeny:



Encefalopatie vzniká v důsledku poškození mozku a je také známá jako komplex demence AIDS.

Průměrný počet případů encefalopatie hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 39,6.


Celkový počet případů encefalopatie hlášených jako vedlejší účinky v roce 2021 byl 745, což představuje nárůst o 1781 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet infekcí kandidózy, kokcidiodomykózy a kryptokokózy hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle let, ve kterých byly hlášeny, :

Number of Candidiasis, Coccidioidomycosis & Cryptococcosis Infections (Common AIDS infections) reported to VAERS as Adverse Reactions to a Vaccine

Year 2000 to 2022

Source: CDC Wonder Vaccine Adverse Event Reporting System



Průměrný počet bakteriálních/plísňových infekcí souvisejících s AIDS hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu mezi lety 2000 a 2020 je 15.


Celkový počet bakteriálních/plísňových infekcí souvisejících s AIDS hlášených jako vedlejší účinky byl v roce 2021 382. To představuje nárůst o 2447 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů sepse nahlášených společností VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19), rozdělené podle roku, ve kterém byly hlášeny:

Number of Sepsis cases reported to VAERS as Adverse Reactions to a Vaccine

Year 2000 to 2022

Source: CDC Wonder Vaccine Adverse Event Reporting System




Sepse je extrémní reakce těla na infekci. Je to život ohrožující zdravotní příhoda. Sepsse nastává, když existující infekce spustí řetězovou reakci v celém těle. Infekce, které vedou k sepsi, nejčastěji začínají v plicích, močových cestách, kůži nebo gastrointestinálním traktu.

Průměrný počet případů sepse hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 75.

Celkový počet případů sepse hlášených jako nežádoucí reakce v roce 2021 byl 1593, což představuje nárůst o 2024 %.

Níže uvedený graf ukazuje počet případů myokarditidy a perikarditidy hlášených VAERS jako nežádoucí reakce na všechny vakcíny (včetně vakcín proti Covid-19) podle roku, ve kterém byly hlášeny:




Myokarditida je zánět srdečního svalu. Perikarditida je zánět ochranných váčků, které obklopují srdce. Obě jsou autoimunitní onemocnění, které byly regulátory léků označeny za možné vedlejší účinky injekcí Covid-19, zejména u mladších mužů.

Průměrný počet případů myo/perikarditidy hlášených jako nežádoucí reakce na vakcínu v letech 2000 až 2020 je 46.

Celkový počet získaných poruch imunity hlášených jako vedlejší účinky byl v roce 2021 15 555. To odpovídá nárůstu o 33 715 %. Šokující, že?

Níže uvedený graf ukazuje procento všech výše uvedených nežádoucích reakcí souvisejících s AIDS hlášených VAERS pro všechny vakcíny podle roku:



Padesát jedna procent všech nežádoucích reakcí souvisejících s AIDS hlášených od roku 2000 bylo hlášeno v roce 2021 a dalších 16 % bylo dosud hlášeno v roce 2022.

Opravdu máme věřit, že jde jen o nešťastnou náhodu? Nebo jsme jen svědky toho, jak americká veřejnost hlásí Centers for Disease Control, že injekce Covid-19 způsobují, že mají syndrom získané imunitní nedostatečnosti?

Oficiální údaje ze Spojeného království a Kanady již silně naznačují, že injekce Covid-19 u plně očkovaných spouštějí oslabující onemocnění, což ukazuje na negativní účinnost vakcíny a negativní výkon imunitního systému.

Nyní však oficiální údaje od americké vlády a Centra pro kontrolu nemocí potvrzují, že u plně očkovaných osob se pravděpodobně rozvine syndrom získané imunodeficiency, přičemž počet onemocnění a infekcí souvisejících s AIDS hlášených VAERS v roce 2021 po zavedení vakcíny Covid-19 se zvýší mezi 1145 % a 33,715 %.

Ví to všichni ti, kdo nyní propagují již 4. dávku? Nebo ji propagují právě proto, že o výše uvedených skutečnostech ví?

ZDROJ: expose-news.com/2022/10/05/cdc-338x-increase-aids-cancer-2021

Překlad: Slovanka/Necenzurovaná Pravda