

MUDr. Joseph A. Ladapo, Floridský Generální státní lékař vydal varování: Neužívejte mRNA vakcíny COVID-19!

- CZ24 News | 13. října 2022

USA: Generální lékař na Floridě vydal varování, aby lidé nepoužívali mRNA covid vakcíny. Více v článku.

„Dnes jsme zveřejnili analýzu mRNA vakcín COVID-19, o které musí veřejnost vědět. Tato analýza ukázala zvýšené riziko úmrtí souvisejících se srdcem u mužů ve věku 18-39 let. FLORIDA nebude o pravdě mlčet.“ ~ MUDr. Joseph A. Ladapo, PhD Generální státní lékař

Poznámka: Přidejte si k tomu VŠECHNY věkové skupiny. Nejen skupinu 18-39!

CELÉ PROHLÁŠENÍ NÍŽE:

Pokyny pro mRNA vakcíny COVID-19

7. října 2022

Florida i nadále zdůrazňuje, že poskytovatelé zdravotní péče musí při rozhodování o poskytování zdravotních služeb, včetně podávání vakcín COVID-19 obsahujících Messenger RNA (mRNA), které využívají vakcíny PfizerBioNTech i Moderna, prověřit všechny údaje a vyhodnotit rizika a přínosy jedinečné pro každého pacienta.

Floridské ministerstvo zdravotnictví (Department of Health) provedlo [analýzu](#) prostřednictvím [samokontrolované série případů](#), což je technika původně vyvinutá k hodnocení bezpečnosti vakcín. Ta zkoumala riziko úmrtí po očkování vakcínou mRNA COVID-19. Tato analýza zjistila, že u mužů ve věku 18-39 let dochází do 28 dnů po očkování vakcínou mRNA k 84% nárůstu relativního výskytu úmrtí souvisejících se srdeční činností. Osoby s již existujícími srdečními onemocněními, jako je myokarditida a perikarditida, by měly být při zvažování očkování obzvláště opatrné a měly by se poradit se svým lékařem.

Floridské ministerstvo zdravotnictví proto vydalo následující pokyny:

Na základě aktuálně dostupných údajů by pacienti měli být informováni o možných srdečních komplikacích, které mohou nastat po podání mRNA vakcíny COVID-19. Vzhledem k vysoké úrovni globální imunity vůči COVID-19 je pravděpodobné, že přínos očkování převáží toto abnormálně vysoké riziko úmrtí souvisejícího se srdcem u mužů v této věkové skupině.

Státní chirurg nyní nedoporučuje očkování mRNA vakcínou COVID-19 u mužů ve věku 18-39 let.

Jednotlivci a poskytovatelé zdravotní péče by si také měli uvědomit, že tato [analýza](#)^[1] zjistila:

- Muži starší 60 let měli o 10 % vyšší riziko úmrtí souvisejícího se srdeční činností do 28 dnů po očkování mRNA.
- U vakcín, které neobsahují MRNA, nebylo zjištěno toto zvýšené riziko u žádné populace.

Floridanům se doporučuje, aby se o všech možných přínosech a rizicích očkování vakcínou mRNA COVID-19 poradili se svým poskytovatelem zdravotní péče. Riziko spojené s očkováním proti mRNA by mělo být zváženo oproti riziku spojenému s infekcí COVID-19.

Ministerstvo nadále trvá na svých [pokynech pro pediatrické vakcíny COVID-19](#) vydaných v březnu 2022, které nedoporučují jejich použití u zdravých dětí a dospívajících ve věku od 5 do 17 let. To nyní zahrnuje i doporučení proti očkování vakcínou COVID-19 u kojenců a dětí mladších 5 let, která byla mezitím vydána v rámci povolení k mimořádnému použití.

Tyto údaje jsou předběžné a vycházejí z údajů ze sledování a úmrtních listů, nikoli ze zdravotnických záznamů.

Překlad: David Formánek

[ZDROJ](#)