

Nebezpečí transfuzí od lidí s očkovanou krví je reálné. Kontaminují krev neočkovaných.

- editor007 | 27. března 2024

SVĚT: Další covidová „dezinformace“ rychle nabírá na hrozivé síle. Kontaminovaná krev po aplikaci mRNA vakcín může v případě transfuze od očkování poškodit i vaši krev. I proto se již neočkovaní v některých zemích sdružují a zakládají krevní banky s krví neočkovaných. Pokud jste viděli, jak vypadá krev některých očkovaných pod mikroskopem, pak je to logické rozhodnutí. Reálnou hrozbu nyní potvrzují i japonští vědci.

Potřebujete transfuzi krve? Pak musíte být opatrní. Alespoň před tím varují japonští vědci. Výzkum Asahikawské lékařské univerzity, Tokijské lékařské univerzitní nemocnice, Okamura Memorial Hospital a Tokijské univerzity věd mimo jiné ukazuje, že existují rizika spojená s krevními transfuzemi, při kterých krev pochází od lidí, kteří dostali mRNA vakcíny proti covidu.

Mohou se objevit krevní abnormality, jako je trombocytopenie a poruchy srážlivosti krve. Kromě toho mohou mRNA vakcíny vést k imunitní dysfunkci a neurologickým komplikacím.

Vědci doporučují, aby krevní produkty získané od očkovaných lidí byly předem důkladně testovány na bezpečnost. Podle nich by se krev měla testovat například na spike proteiny, složky vakcín a imunitní hodnoty.

Doporučují také vypracovat jasné pokyny pro odběr, skladování a transfuzi krevních produktů od očkovaných osob. Měly by být zavedeny přísné protokoly pro screening dárců, označování produktů a hlášení vedlejších účinků, říkájí.

Výzkumníci také poukazují na důležitost zvyšování povědomí: informovat veřejnost o rizicích vakcín, krevních transfuzí a imunitních poruchách. Tyto informace by měly být poskytovány zdravotníkům, pacientům a veřejnosti, aby se lidé mohli informovaně rozhodnout.

A konečně, japonští vědci argumentují pro změny v zákoně, který by označoval krevní transfuze. Na první pohled je pak jasné, zda krev pochází z očkovaných nebo neočkovaných zdrojů.

Zjištění vědců byla publikována na preprintovém serveru a v současné době procházejí recenzním řízením.

V tělech zemřelých lidí se začaly objevovat obrovské sraženiny:

Japonští vědci varují před riziky krevních transfuzí od lidí očkovaných proti covidu.

Zveřejněný [preprint varuje](#) před riziky spojenými s používáním krve od lidí očkovaných proti covidu ke krevním transfuzím a vyzývá zdravotníky, aby si těchto rizik byli vědomi.

Navíc, aby se těmto rizikům předešlo a předešlo se dalším kontaminacím krevních produktů a následným komplikacím, žádají o pozastavení „očkování“ proti covidu.

„Zdravotní poškození způsobená genetickou vakcinací jsou již nyní extrémně vážná a je nejvyšší čas, aby země a příslušné organizace společně podnikly konkrétní kroky k identifikaci rizik a jejich kontrole a řešení“.

Mnoho zemí po celém světě oznámilo, že takzvané genetické vakcíny – jako například vakcíny využívající modifikovanou mRNA kódující spike protein a lipidové nanočástice jako systém podávání léků – patří k postvakcinační trombóze a následnému kardiovaskulárnímu poškození, stejně jako k široké řadě různých nemocí zahrnujících všechny orgány a systémy, včetně nervového systému.

Na základě těchto zpráv a množství důkazů, které byly zveřejněny, vědci prostřednictvím svého článku upozorňují zdravotníky na různá rizika spojená s krevními transfuzemi za použití krevních produktů pocházejících od lidí, kteří trpěli dlouhodobou nemocí covid a příjemci genetické vakcíny, včetně těch, kteří dostali vakcíny mRNA .

„Je třeba také zdůraznit, že zde diskutované problémy se týkají všech transplantačních orgánů, včetně transplantací kostní dřeně, a nejen krevních produktů.“

Tabulka 1 tohoto dokumentu shrnuje šest hlavních problémů identifikovaných výzkumníky s použitím krevních produktů získaných od příjemců genové vakcíny. Zkopírovali jsme obsah tabulky 1 níže.

1. Kontaminace proteinem.

U spike proteinu, který je antigenem SARS-CoV-2 a genetických vakcín, již bylo zjištěno, že má různé toxicity, včetně účinků na červené krvinky a agregaci krevních destiček, tvorbu amyloidů a neurotoxicitu. Je nezbytný, že samotný spike protein je pro člověka toxický. Bylo také hlášeno, že spike protein může procházet hematoencefalickou bariérou. Proto je nutné odstranit spike protein odvozený ze samotné genové vakcíny z krevních produktů.

2. Kontaminace amyloidními agregáty a mikrotromby tvořenými spike proteiny.

Dosud není jasné, jak se amyloidní agregáty a mikrotromby tvořené spike proteiny vyvinou do viditelných trombů. Jakmile se však amyloidní agregáty vytvoří, nemusí být snadno odstraněny, a proto je třeba z krevních produktů odstranit. Tyto amyloidní agregáty se také ukázaly jako toxické.

3. Události, které lze připsat sníženému imunitnímu systému dárce a imunitnímu abnormálnímu systému v důsledku imunitního imprintingu nebo přechodu třídy na IgG4 atd. v důsledku více dávek genetických vakcín.

Když je imunitní funkce dárce narušena genovou vakcinací, existuje riziko, že dárce má nějaké (subklinické) infekční nebo je infikován patogenním virem a má rozvinutou virémii nebo jiná onemocnění, i když dárce nemá žádné subjektivní příznaky . Z tohoto důvodu zdravotničtí pracovníci, kteří provádějí chirurgické zákroky, včetně odběru krve a transplantačních orgánů, a také používají krevní produkty, měli nakládat s krví příjemců genetické vakcíny opatrně, aby zabránili infekci krve. O rizicích bude rovněž nutné informovat všechny zdravotnické pracovníky.

4. Lipidové nanočástice ("LNP") a pseudouridinovaná mRNA (pouze mRNA vakcíny).

V případě mRNA vakcíny mohou LNP a pseudouridinovaná mRNA zůstat v krvi příjemců, pokud je krev odebrána bez dostatečného odkladu po genové vakcinaci. LNP jsou vysoce zánětlivé a bylo

zjištěno, že jsou sami o sobě trombogenní, což představuje riziko pro příjemce transfuze. LNP sami o sobě mají silnou adjuvantní aktivitu a jsou vystaveny riziku vyvolání autoimunitního syndromu indukovaného adjuvans („ASIA syndrom“). Dalším rizikem je, že pokud je pseudouridinovaná mRNA začleněná do krve příjemce, zatímco je stále zabalena v LNP, může se v těle příjemce produkovat další spike protein.

5. Kontaminace agregovanými červenými krvinkami nebo krevními destičkami.

Špičkový protein agregaci červenýchrvinek a krevních destiček, a proto tyto agregáty budou přeneseny do krve příjemce, pokud nebudou odstraněny z krevního produktu.

6. Paměťové B buňky produkující IgG4 a IgG4 produkované z nich.

Velké množství (koncentrace v séru typicky nad 1,25–1,4 g/l) nezánnětlivých IgG4-pozitivních plazmatických buněk může způsobit chronický zánět, jako je fibrozánětlivé onemocnění.

IgG4 je protilátka a je to zkratka pro imunoglobulin G4. Dříve v článku autoři napsali, že „dlouhodobá expozice specifickému identickému antigenu (v tomto případě spike proteinu) způsobí, že se imunoglobuliny stanou IgG4 a z B buněk [nebo lymfocytů], které produkují, se pravděpodobně liší na paměťových B buněk, které přežívají v těle po delší dobu, očekává se, že imunitní dysfunkce příjemců genetické vakcíny bude prodloužena (tabulka 1, bod 3 a 6). Očekává se, že v budoucnu budou odhaleny další podrobnosti o bodech.“

Výzkumníci také navrhuji specifické testy, testovací metody a předpisy, které s těmito riziky vypořádají.

V závěru autoři napsali:

Vliv těchto genetických vakcín na krevní produkty a skutečné škody jimi způsobené nejsou v současnosti známy. Proto, abychom vyhnuli těmto rizikům a předešli dalšímu rozšiřování kontaminace krve a komplikaci situace, důrazně žádáme, aby byla očkovací kampaň s použitím genetických vakcín pozastavena a aby bylo co nejdříve provedeno posouzení škod a přínosů.

Jak jsme opakovaně uvedli, zdravotní poškození způsobené genetickou vakcinací jsou nyní mimořádně závažné a je nejvyšší čas, aby země a příslušné organizace společně podnikly konkrétní k identifikaci rizik a jejich kontroly a řešení.

Zpracoval: NespokojenyCz

ZDROJ: The Expose / ninefornews

Zdroje a další informace:

[Japanese researchers warn about the risks of blood transfusions from covid vaccinated people](#)

[Japonští vědci varují před nebezpečím krevních transfuzí s očkovanou krví](#)

[Opgepast: Japanse onderzoekers waarschuwen voor gevaar van bloedtransfusies met gevaccineerd bloed](#)

[Japanese Researchers Warn About Risks Associated with Blood Transfusions From Covid-19 mRNA Vaccinated Individuals3](#)

[Japan To Ban Vaccinated People From Donating ‘Tainted Blood’](#)

[Researchers Warn Of Blood Transfusions With “Vaccinated” Blood](#)