

NEMECKÁ VEDECKÁ ŠTÚDIA (NA STIAHNUTIE) NA DEŤOCH ZISTILA, ŽE UŽ 3 MINÚTOVÉ NOSENIE RÚŠKA JE TOXICKÉ A MIMORIADNE NEBEZPEČNÉ!

- CZ24 News | 6. srpna 2021

Výsledky klinického testu, vykonaného začiatkom tohto roku zistili, že nosenie rúška už i po dobu troch minút malo na deti „nepriaznivé účinky“ a mohlo by viesť k dýchacím problémom.

Výsledky randomizovaného klinického testu, vykonaného 9. a 10. apríla 2021 na 45 deťoch, podrobne líči správa z výskumu nazvaného „Experimentálne posúdenie obsahu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu s alebo bez tvárových rúšok u zdravých detí“.

[Štúdiu](#) (vo formáte PDF ju stiahnete [TU](#)) realizoval tím siedmich výskumníkov, medzi ktorých patrili Harald Walach, PhD., Ronald Weikl, MD. a Juliane Prenticeová, BA.

(Poznámka redakcie: Štúdia bola medzičasom žurnálom JAMA Network stiahnutá. To sa však dalo čakať, nakoľko všetky štúdie a objavy, ktoré odporujú oficiálne pretláčanému naratívu covidových zločincov, sa umlčievajú.)

Správa uviedla, že mnoho vlád vo svete spravilo „nosenie, respektíve prekrytie nosa a úst tvárovými rúškami pre školákov povinným“, a že „dôkazová základňa“ pre to je „chabá“.

Podľa správy rozsiahly prieskum v Nemecku o nepriaznivých účinkoch vdychovania oxidu uhličitého na rodičov a deti nosiacich tvárové rúška - s použitím dát 25 930 ľudí - ukázal, že 68% zúčastnených detí malo pri nosení prekrytia tváre dýchacie problémy.

V dôsledku toho nemecký Federálny úrad pre životné prostredie vyhlásil, že limitom pre uzatvorené priestory je hladina 0,2% objemu oxidu uhličitého, alebo tiež 2000 ppm.

Normálny obsah oxidu uhličitého v otvorenom priestore je asi 0,04% objemu (t.j. 400 ppm) - a všetko, čo presahuje túto hladinu, sa považuje za neakceptovateľné.

Priebeh štúdie

Počas štúdie merali výskumníci hladinu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu s dvoma typmi tvárových rúšok a bez nich v kontrolovanej a dobre vetranej miestnosti, využívajúc ako dobrovoľníkov zdravé deti.

Výskumníci merali tri minúty základné hladiny oxidu uhličitého bez rúška, potom bolo vykonané deväťminútové meranie pre každý typ tvárového rúška: po tri minúty na zmeranie obsahu oxidu uhličitého v dávke vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu a tri minúty na zmeranie obsahu oxidu uhličitého počas výdychu.

Obsah oxidu uhličitého v okolitom vzduchu bol za použitia ventilátorov v miestnosti udržiavaný stále pod 0,1% objemu. Podľa správy z výskumu bolo poradie rúšok vždy náhodné, „zaslepené a rozvrstvené podľa veku detí“.

V správe výskumníci uviedli, že priemerný vek detí bol 10,7 rokov (rozpätie 6-17 rokov) z 20 dievčat a 25 chlapcov.

Jediný vplyv na výsledky sa zdal mať vek detí, keďže to malo istý vplyv na obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu, použitie dvoch rôznych typov tvárových rúšok však na vdychovanie obsahu oxidu uhličitého žiadny vplyv nemalo.


Čo zistili vedci

Počas štúdie výskumníci namerali stredné hodnoty medzi 13 120 (384) a 13 910 (374) ppm oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu pod chirurgickými rúškami a respirátormi (FFP2), ktoré (hodnoty), ako uviedli výskumníci:

„Sú šesťnásobne vyššie než to, čo už za neakceptovateľné považuje nemecký Federálny úrad životného prostredia“.

Táto znepokojivo vysoká hodnota bola dosiahnutá len po troch minútach merania, lenže deti v školách za normálnych podmienok nosia rúška „v priemere 270 (pri interkvartilovom rozpätí 120-390) minút“.

Distribúcia obsahu oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu za použitia tvárového rúška podľa veku



Graf:

Zdroj: JAMA Network. Tento graf zobrazuje diagram rozptylu obsahu oxidu uhličitého vo vdýchnutom vzduchu pod respirátorom podľa veku.

Podľa vyššie uvedeného grafu bola hodnota u dieťaťa s najnižšou hladinou oxidu uhličitého 3-krát vyššia než limit 0,2% objemu (2000 ppm). Navyše, najvyššie hodnoty mali v štúdiu tie najmladšie deti, keď nameraná hodnota oxidu uhličitého u jedného sedemročného dieťaťa bola 25 000 ppm (12,5-

násobok limitu).

Výskumníci dospeli k záveru, že ponosy detí počas štúdie boli „dôsledkom zvýšených hladín oxidu uhličitého“ z dôvodu „objemu mŕtveho priestoru v rúškach (priestor medzi rúškom a tvárou), ktorý po krátkom čase rýchlo zbiera vydýchnutý oxid uhličitý“.

Oxid uhličitý usadený v rúšku sa potom mieša so zostávajúcim čerstvým vzduchom pod rúškom a zvyšuje pod ním obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu, čo bolo podľa výskumníkov v tejto štúdii zreteľnejšie u mladších detí.

Znepokojujúce je, že účinky vdychovania oxidu uhličitého cez rúška vedú k „poškodeniam, ktoré by sa dali pripísať hyperkapnii“.

K hyperkapnii dochádza vtedy, keď je v krvnom riečisku prítomného priveľa oxidu uhličitého a môže spôsobovať symptómy ako sú závrat, bolesti hlavy a dýchavičnosť. Silná hyperkapnia, ak sa nelieči, však môže byť životunebezpečná a môže spôsobovať symptómy ako sú záchvaty, návaly paniky a strata vedomia.

Záver

Na záver výskumníci poradili, aby si tí, čo rozhodujú, pozreli dôkazy, predkladané podobnými štúdiami, jasne dokazujúce, že deti by nemali byť nútené nosiť tvárové rúška.

Pomaly sa blíži nový školský rok a je možné takmer s istotou predpokladať, že táto zločinná povinnosť nosenia rúšok deťmi v školách bude pokračovať. A čo je najhoršie, mnohí rodičia a deti si už možno na rúška ako súčasť výučby zvykli.

Podľa nášho názoru sa však stále jedná o neakceptovateľné týranie a ohrozovanie detí. Snahy o zrušenie tohto šíleného nariadenia nesmú preto poľaviť! Ide predsa o zdravie a životy toho najcennejšieho čo máme – našich detí.