


Nová německá studie: Covid injekce (tzv. „vakciny“) jednoznačně ničí imunitu

- CZ24 News | 16. září 2022

Matematik z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., [komentoval](#) výsledky rozsáhlé [observační studie](#), ve které autoři sledovali téměř 900 tisíc dětí ve věku 5-11 let v Severní Karolíně. Pokud je studie validní, vede podle Fürsta k závěrům, že očkování proti covidu-19 oslabuje imunitu očkováných dětí. Po necelém půlroce jsou podle studie děti náchylnější k infekci než neočkované, a to nezávisle na tom, jestli již infekci prodělaly, či nikoliv.




Asi 270 tisíc dětí (30,8 %) bylo očkováno alespoň jednou dávkou mRNA vakcíny firmy Pfizer proti onemocnění covid-19 v období mezi 1. listopadem 2021 a 3. červnem 2022. Přibližně 190 tisíc dětí reportovalo pozitivní test na infekci koronavirem v období mezi 11. březnem 2020 a 3. červnem 2022.

Jak Fürst popisuje, autoři sledovali časový průběh účinnosti vakcíny (proti nákaze) a účinnosti předchozího prodělání infekce. „Mám mnoho výhrad k použitým matematickým metodám, ale pro účely tohoto textu je všechny spolknou a budu prostě předpokládat, že prezentované grafy alespoň kvalitativně odrážejí realitu,“ píše Fürst.

„Výsledky jsou více než fascinující. Obrázek A ukazuje rychlý pokles účinnosti vakcín na pozadí průběhu tří vln epidemie,“ vysvětluje doktor Fürst a dodává, že „na tom není nic zvláštního“, neboť „už jsme si všichni všimli, že účinnost vakcín klesá po několika měsících do záporných hodnot.“

Podle Fürsta To je tento jev „jednou ze zvláštností této vakcíny – činí vás více náchylnými k infekci“.




<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2209371>

Graf **B** ukazuje, že tento pokles účinnosti do *záporných hodnot* je velmi překvapivě nezávislý na předchozím prodělání infekce. „Po necelém půlroce jsou očkované děti více náchylné k infekci než neočkované, a to nezávisle na tom, jestli již infekci prodělaly, či nikoliv,“ píše Fürst.

„Úžas ovšem vyvolá pohled na druhou dvojici obrázků. Obrázek **C** totiž ukazuje, že u *neočkovaných dětí* přirozená imunita funguje bezvadně a předchozí prodělání nemoci poskytuje sice klesající, ale trvale kladnou ochranu proti všem variantám,“ hodnotí výsledky analýzy doktor Fürst.

Ovšem obrázek **D** dle Fürsta ukazuje, že „u očkovanych dětí imunita získaná předchozím proděláním velmi rychle klesá až k nule (a možná i dál, to nám ovšem autoři neukázali)“.



<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2209371>

Podle doktora Fürsta je několik možností, jak výše citované grafy vysvětlit. Může se jednat o nějaké nedorozumění, které vyplývá z nesprávného vyhodnocování dat, protože jak sám říká, „za poslední dva roky vyšly i horší věci“, a odkazuje se na starší [článek](#) hodnotící studii amerického Centra pro kontrolu nemocí (CDC).

Zdroje dlouhodobě skeptické k účinku vakcín [přišly](#) s interpretací, že data jsou konzistentní

s hypotézou, že vakcína poškozuje imunitní systém. Tedy nejen, že vakcína funguje naopak (zvyšuje riziko infekce), ale ještě maže ochranný efekt přirozené imunity.

„Řečeno ještě více polopatě – kdo infekci prodělal, tak je docela dobře chráněn, až do doby, kdy se nechá naočkovat, čímž tu ochranu zase smaže,“ takto někteří výsledky studie vysvětlují. „Tato interpretace je navíc konzistentní s pozorovaným nárůstem *jiných* infekčních onemocnění po očkování (pásové opary, hepatitidy apod.).“

Tomáš Füst v závěru svého hodnocení výsledků studie „emocionálně zcela neutrálně konstatuje, že výše citované grafy s touto hypotézou skutečně konzistentní jsou“, ovšem jak zmiňuje výše, je také možné, že shromážděná data nebyla správně vyhodnocována.

Doktor Füst se nicméně podivuje nad tím, jak výše uvedenou studii interpretují samotní autoři, kteří píší: „Rychlý pokles ochrany proti omikronové infekci, kterou poskytlo očkování a předchozí infekce, poskytuje podporu pro posilovací očkování.“

Tedy autoři studie nejenom, že neupozorňují na negativní účinky vakcinace na imunitu dětí, ale vidí klesající účinnost ochrany vakcínou jako důvod pro „další dávku“. Nehledě na to, že výsledky studie, tak jak je prezentují, ukazují na jiné závažné závěry ohledně účinků očkování na imunitu očkováných dětí ve věku 5–11 let, doporučují další vakcinaci namísto logičtějšího doporučení k ukončení vakcinace.

AUTOR: Milan Kajínek

ZDROJ: [1](#) / [2](#)

Překlad: epochtimes.cz