

NOVÉ AMERICKÉ A NĚMECKÉ VĚDECKÉ STUDIE: COVID INJEKCE NIČÍ IMUNITNÍ SYSTÉM

- CZ24 News | 25. srpna 2021

V humánní medicíně ještě nikdy neexistovala schválená vakcína mRNA proti infekční nemoci. Zatímco případů závažných vedlejších účinků přibývá, nevylučuje současná studie riziko fatálního poškození takzvaným fenoménem ADE (Antibody-Dependent Enhancement).

Stále více vědeckých příspěvků naznačuje, že očkování proti koronaviru by mohlo zvýšit riziko závažných onemocnění. Příčina spočívá právě v procesu známém jako ADE. Stejnějmené infekci posilující protilátky se vážou na povrch virů, ale nemohou je neutralizovat. To vede k jednoduššímu proniknutí viru do buňky a tím podporuje jeho šíření a reprodukci. Stephanie Seneff z Massachusetts Institute of Technology a Greg Nigh z Naturopathic Oncology v Portlandu diskutují o tomto riziku ve více než 40stránkovém [příspěvku](#).

Stejným směrem ukazují zjištění [výzkumného týmu z](#) Helmholtzova centra pro [výzkum](#) infekcí, lékařské školy v Hannoveru, univerzity v Bonnu a lékařů a výzkumných pracovníků z Erasmus Medical Center v Rotterdamu. Po očkování byla snížena reakce imunitního systému na takzvané nástrojové receptory. Ty hrají zásadní roli v přirozeném imunitním systému člověka, protože rozpoznávají struktury patogenů.

Nežádoucí protilátky zvyšující infekci

Po očkování byla imunitní odpověď na tyto receptory omezena nejen virovými, ale také bakteriálními patogeny. Jinými slovy: vakcíny mRNA mění imunitní odpověď vrozeného imunitního systému a imunitu na pozadí na patogeny. Institut Paula Ehrlicha již také poukázal na to, že nežádoucí protilátky zesilující infekci po očkování nebo po koronavirovém onemocnění by v nejhorším případě mohly vést ke zvýšené infekci v případě další infekce.

Další obavy vyvolává nedávný [příspěvek](#) v recenzovaném odborném časopise „Journal of Infection“. Podle toho současné vakcíny vytvářejí určitou imunitu proti původní variantě koronaviru, ale podle modelových výpočtů autorů studie by se to mohlo změnit s mutacemi viru. Podle autorů by očkovaní lidé již nemohli mít fungující imunitní systém bez posilovacího očkování proti novým infekcím. Zvláště vysoké je riziko ADE při infekci Delta variantou.

Každý, kdo je očkován, bude mít krevní sraženiny

Protilátky zesilující infekci navíc vyvolávají takzvanou cytokinovou bouři, která je nezřídka smrtelná. O tom diskutoval Sean Brooks na [přednášce](#), kterou zde můžete vidět u příležitosti zasedání školského výboru SW Ohio. Lektor s [doktorátem](#) ve vzdělávání a dle vlastních údajů autor 23 knih, se ve své řeči odkazuje na různé zdroje, včetně prohlášení virologa a mikrobiologa [Roberta Melona](#), který se v 80. letech podílel na vývoji technologie, která je použita v dnešních mRNA vakcínách.

Kromě zesílení závisujícím na protilátkách a oslabení imunitního systému uvádí jako třetí smrtelné riziko trombózu: „Každý, kdo je očkován, bude mít krevní sraženiny. Pokud mi nevěříte, existuje

způsob, jak to zjistit," říká Brooks. „Provedte takzvaný test D-dimeru, pomocí kterého je detekována koagulace krve na mikroskopické úrovni. Právě teď, když k vám mluvím, vyřezáváme z lidí krevní sraženiny.“

Na základě statistik „[Our World in Data](#)“ byla téměř třetina světové populace očkována buď vektorovou nebo mRNA vakcínou. Pokud se teorie ADE v tomto kontextu ukáže jako pravdivá, mohla by být ovlivněna imunitní reakce přibližně 2,5 miliardy lidí.

Překlad: tadesco/tereza