

ODBORNÝ LEKÁRSKY MAGAZÍN LANCET CITUJE OXFORDSKÚ ŠTÚDIU: MIERA INFEKČNOSTI - VEĽKOSTI VÍRUSOVEJ DÁVKY (NÁLOŽE) U OČKOVANÝCH ZDRAVOTNÍKOV JE 251-NÁSOBNE VYŠŠIA AKO U ICH NEOČKOVANÝCH KOLEGOV S PRIRODZENOU IMUNITOU!

- CZ24 News | 29. září 2021

Priekopnícka predtlačová štúdia Skupiny klinického výskumu Oxfordskej univerzity, publikovaná 10. Augusta 2021 v časopise Lancet, obsahuje alarmujúce zistenia, ničivé pre zavádzanie vakcíny na COVID-19.

Štúdia zistila, že zaočkovaní jednotlivci majú vo svojich nozdrách až 251-krát vyššiu nálož vírusov SARS-CoV-2 než tí nezaočkovaní.

Sú očkovaní superšíritelia?

Hoci očkovanie symptómy infekcie zmierňuje, zaočkovaným jednotlivcom umožňuje nieť nezvyčajne vysoké vírusové nálože bez toho, aby predtým ochoreli, čo ich potenciálne mení na bezpríznakových superšíritelov.

Tento jav môže byť globálne u silne zaočkovaných populácií zdrojom šokujúcich povakcinačných vln.

Autori štúdie, Chau a kolektív, demonštrovali rozsiahle zlyhanie covidovej vakcíny a prenos za prísne kontrolovaných podmienok počas nemocničného lockdownu v Ho či Minovom meste vo Vietname.

Vedci skúmali zdravotníkov, ktorí nemohli dva týždne odísť z nemocnice.

Dáta ukázali, že plne zaočkovaní pracovníci – asi dva mesiace po zaočkovaní vakcínou Oxford/AstraZeneca (AZD1222) na ochorenie COVID-19 – získali, niesli a zrejme aj prenášali variant delta na svojich zaočkovaných kolegov.

Infekciu delta variantom tiež takmer určite odovzdávali náchylným nezaočkovaným ľuďom, vrátane svojich pacientov. Sekvenovanie kmeňov potvrdilo, že na seba vzájomne prenášali SARS-CoV-2.

Toto zistenie je v súlade s pozorovaniami Farinholta a jeho kolegov v USA a v zhode s poznámkami riaditeľky Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, pripúšťajúcej, že vakcíny na COVID-19 v zastavení prenosu SARS-CoV-2 zlyhali.

Dňa 11. februára Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že účinnosť vakcíny AZD1222 proti rozvinutiu sa symptomatickej infekcie je 63,09%.

Závery Chauovej štúdie podporujú varovania popredných zdravotníckych odborníkov, že čiastočná, nesterilizujúca imunita z troch notoricky „deravých“ vakcín na COVID-19 umožňuje v porovnaní so vzorkami z doby pred očkovaním v roku 2020 prenos 251-krát vyššej vírusovej nálože SAR-CoV-2.

Je očkovanie zodpovedné za delta vlnu?

Máme teda kľúčovú časť puzzle, vysvetľujúcu, prečo je taká hrozivá epidémia delta – plne zaočkovaní sa podieľajú ako pacienti s ochorením COVID-19 a fungujú ako supersíritelia infekcie v štýle Týfusovej Mary.

Zaočkovaní jednotlivci odpaľujú do svojich komunít koncentrované vírusové explózie a podporujú nové vlny covidu. Zaočkovaní zdravotníci takmer určite infikujú svojich spolupracovníkov a pacientov, spôsobujúc strašné súbežné škody.

Pokračujúce očkovanie tento problém iba zhorší, najmä medzi lekármi prvej línie a zdravotnými sestrami, ktorí sa starajú sa o zraniteľných pacientov.

Zdravotnícke systémy by mali okamžite prestať s povinným očkovaním.

Namiesto toho je potrebné vziať skupinu vylicených pracovníkov, ktorí sú silne imúnni voči delte a zvážiť dôsledky ich momentálne zaočkovaných zdravotníkov ako potenciálnych hrozieb pre silne rizikových pacientov a spolupracovníkov.

Spracoval: Badatel.net