

Skorumpovaný slovenský Ústav pre kontrolu liečiv priznal prípady zápalu srdcového svalu po vakcíne proti covidu. Zároveň si neodpustil bagatelizovanie závažnosti negatívnych následkov

- CZ24 News | 15. června 2021



SLOVENSKO: ŠÚKL vo svojom stanovisku zároveň zľahčil závažnosť negatívnych účinkov po očkovaní, keď hovorí o miernom priebehu a ustúpe ochorenia do niekoľkých dní.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) evidoval k piatku päť prípadov myokarditídy, teda zápalu srdcového svalu či perikarditídy, teda zápalu obalu srdcového svalu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

„Myokarditída a perikarditída sú zápalové ochorenia srdca, ktoré sa môžu vyskytnúť po infekciách alebo imunitných ochoreniach. Ich výskyt v populácii Európskeho hospodárskeho priestoru sa pohybuje od jedného do desiatich prípadov zo 100-tisíc za rok. Ochorenie má zväčša mierny priebeh a k zotaveniu zvyčajne dôjde spontánne alebo po nasadení liečby,“ uviedol štátny ústav.

Preskúmanie spustila Európska lieková agentúra (EMA) v apríli po prípadoch myokarditídy hlásených v Izraeli po vakcíne od konzorcia Pfizer/BioNTech. Väčšina prípadov mala podľa informácií ŠÚKL mierny priebeh a ochorenie ustúpilo do niekoľkých dní. Vyskytli sa najmä u mužov do 30 rokov. Symptómy sa objavili zväčša niekoľko dní po druhej dávke vakcíny. EMA v súčasnosti dáta

analyzuje.

Pacientom, u ktorých sa po očkovaní vyskytnú dýchavičnosť, prudký tlkot srdca, ktorý môže byť nepravidelný či bolesť na hrudníku, odporúča ŠÚKL vyhľadať lekársku starostlivosť.

EMA aj ŠÚKL vyzývajú zdravotníckych pracovníkov, aby nahlásili prípady myokarditídy alebo perikarditídy po očkovaní či iné podozrenia na závažné nežiaduce účinky.

Zdroj: <https://www.infovojna.sk>