

# ŠOKUJÚCE A NEPOCHOPITELNÉ ZLO! GATESOVA MAFIA, BRITSKÍ HYGIENICI A ZDRAVOTNÁ SLUŽBA VRAŽDILI PACIENTOV, ABY ZDISKREDITOVALI SLUBNÝ LIEK PROTI OCHORENIU COVID!

- CZ24 News | 23. července 2021

UK: Dňa 1. apríla 2020 podpísali hlavní hygienici Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska a tiež riaditeľ Národnej zdravotnej služby Stephen Powis odkaz, poslaný ich kolegom z Národnej zdravotnej služby (NHS).

Žiadali v ňom o vynaloženie všemožného úsilia na zapojenie pacientov s ochorením COVID-19 do klinických testov národnej priority.

## **Sabotáž testovania potenciálneho lieku**

Tými testami boli:

1. PRINCÍP (rizikovejší pacienti v teste primárnej starostlivosti)
2. ZOTAVENIE (v nemocničnom teste)
3. REMAP-CAP (test na kriticky chorých pacientoch)

Jedným z testovaných liekov bol hydroxychlorochín. V testoch RECOVERY a REMAP-CAP použili extrémne vysokú a potenciálne smrtiacu dávku: 800 mg v čase 0 a 6 hodín, po ktorej po 12 hodinách nasledovalo 400 mg a potom každých 12 hodín po deväť ďalších dní.

Pacient tak dostal za prvých 24 hodín liečby 2400 mg.

Podľa Davida Jayneho, profesora klinickej autoimunity na Cambridgeskej univerzite:

*„Predávkovanie hydroxychlorochínom sa spája s kardiovaskulárnou, neurologickou a ďalšími toxicitami, ku ktorým dochádza pri dávkach nad 1500 mg. A vyššie dávky sa spájajú s mortalitou.“*

V článku pre časopis BMJ (dá sa nájsť [TU](#)) jeden z vedúcich testu RECOVERY Martin Landray vysvetlil:

*„Tá dávka vychádza z modelovania Nicka Whitea, profesora tropickej medicíny na Oxfordskej univerzite a jeho tímu, ktorí majú s týmto liekom rozsiahle skúsenosti.“*

Sir Nicholas White bol 13. marca súčasťou „Neformálnej konzultácie o potenciálnej role chlorochínu v klinickom zvládaní infekcie COVID-19“. Prítomných bolo aj 5 „expertov“, členov Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov.

Test SOLIDARITY, vykonaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), použil rovnaké dávky hydroxychlorochínu ako testy RECOVERY a REMAP-CAP.

Oveľa nižšiu a bezpečnejšiu dávku odporučili už 9. marca 2020 [čínski vedci](#):

„Pri infekcii SARS-CoV-2 sa odporúča podať orálne dvakrát denne dávku 400 mg síranu hydroxychlorochínu, po čom nasleduje udržiavacia dávka 200 mg, podávaná dvakrát denne po dobu 4 dní“.

Test RECOVERY zaznamenal svojich prvých pacientov 19. marca (pozrite si záznam od 9. minúty):


Test REMAP-CAP bol celosvetový, ktorý mal v Anglicku veľmi veľký počet zúčastnených miest:

<https://www.remapcap.org/participating-sites>

## Testované miesta v Anglicku mali najvyššie nadmerné úmrtia

Najväčšie zhľuky zúčastnených miest na teste REMAP-CAP boli v Londýne a oblastiach West Midlands a North West.

Podľa Financial Times zaznamenali tieto regióny na jar 2020 najvyšší nárast nadmerných úmrtí:



Existuje genetická porucha známa ako deficiencia G6PD, rozšírená hlavne v častiach sveta, kde je endemická malária, napríklad v subsaharskej Afrike.

Liek hydroxychlorochín je nebezpečnejší pre ľudí s deficienciou G6PD.

Nemecký lekár Wolfgang Wodarg ponúkol časopisu British Medical Journal (BMJ) vysvetlenie nadmerného zastúpenia etnických menšín medzi pacientmi a zdravotníckym personálom v štatistikách úmrtí na COVID-19:

„Podľa mňa by jednou z možných príčin pre viac obetí ochorenia Covid-19 medzi pacientmi

a zdravotníckym personálom, ktorí majú predkov z krajín s maláriou, mohlo byť rozšírené používanie chlorochínu (cq) a hydroxychlorochínu (hcq) na liečbu a profylaktické indikácie u pacientov s deficienciou G6PD.“

„Národný štatistický úrad zisťuje, že černosi zomierajú na Covid-19 so štyrikrát vyššou pravdepodobnosťou.“ ([zdroj](#))

V rozhovore s Vinayom Prasadom uviedol jeden z najlepších svetových epidemiológov John Ioannidis o chybách z „prvej vlny“ nasledovné:

„... pravdepodobne sme iba liečbou hydroxychlorochínom zabili celosvetovo asi 100 000 ľudí“.

(nájdete to v čase od 1 hodiny 37 minút na [tomto videu](#))

Torsten Engelbrecht a Claus Köhnlein, MD (spoluautori knihy “Vírusmánia”) sú presvedčením, že to číslo by mohlo byť oveľa vyššie vo [svojom článku](#) s názvom:

„COVID-19 (nadmerné) úmrtia: virálna príčina nemožná - v približne 200 000 extra úmrtiach len v Európe a USA zohrali kľúčovú rolu lieky“

## Vývoj udalostí vo Veľkej Británii pred a počas 1. vlny pandémie

Prvým oficiálne mŕtvym na COVID-19 bol v januári 2020 Peter Attwood.

Dňa 7. januára 2020 ho prijali do nemocnice so silným kašľom. Vírus - údajne prenosnejší a smrtiacejší než chrípka - bol preto v Spojenom kráľovstve už v decembri, ak nie skôr.

V januári ani februári neboli v Spojenom kráľovstve žiadne nadmerné úmrtia. Tie sa začali až v polovici marca a kryli sa so:

1. Zavedením lockdownu
2. Prepúšťaním pacientov (ktorí neboli celkom doliečení) z nemocníc (kde najpravdepodobnejšie chytíte nejakú infekciu) do zariadení opatrovateľskej starostlivosti (kde sú tí najzraniteľnejší ľudia)
3. Testami, pri ktorých boli podávané extrémne vysoké a potenciálne smrtiace dávky hydroxychlorochínu

## Záver

Tento článok je ďalším z dôkazov, ako sa systém silou mocou snaží zdiskreditovať každý slubný liek proti ochoreniu COVID-19.

Na začiatku pandémie sa aspoň tvárili, že hľadajú vhodné spôsoby diagnostiky, liečby a prevencie (vakcíny). Teraz sa však už ani len nesnažia skrývať, že jediné, o čo im ide, je pretláčanie vakcín.

Každú liečbu, ktorá je ľahko dostupná a hlavne lacná, čiže farma firmy na nej nedokáže zarobiť, chcú zničiť. Dokonca aj za cenu, že tým doslova zavražia pacientov presne tak, ako sa to stalo počas spomínaných štúdií.