

Steve Kirsch: Nová studie ukazuje, že COVID vakcíny poškozují srdce téměř vždy a všem

- CZ24 News | 23. října 2022

Nová studie ukazuje, že téměř u všech, kteří dostávají vakcíny mRNA COVID, dochází k určitému poškození srdce. Více v článku.

Originál článku publikován [ZDE](#): 22. října 2022

Jen vám to nedávají najevo. V Kanadě je lékařská komunita v tomto ohledu velmi chytrá: nedovolí lékařům měřit hladinu troponinu před očkováním, takže nikdo není moudrý.

Shrnutí

Nová studie ukazuje, že téměř u všech, kteří dostávají vakcíny mRNA COVID, dochází k určitému poškození srdce.

Informace o studii přinesl dr. Vinay Prasad v tomto [videu](#).

Nová švýcarská studie ukazuje, že očkovaní lidé mají shodně vyšší hladiny troponinu než jejich neočkovaní vrstevníci.

Na grafu v čase 6:21 vidíme, že 777 osob, které v této studii dostaly očkovací látku, má shodně vyšší hladiny troponinu než jejich neočkovaní vrstevníci.



To by se nemělo stát. Pokud jsou vakcíny bezpečné, měly by být hladiny troponinu mezi očkovanými a neočkovanými skupinami téměř shodné.

Zde jsou přesná slova profesora Prasada:

Nejde jen o špičku distribuce, která má zvýšenou citlivost troponinu, ale o to, že *celá distribuce* je posunutá doprava. **Všichni mají trochu zvýšenou hladinu vysoce citlivého troponinu.** To je to, co by se dalo odvodit z tohoto grafu.

[Troponin se zvýší, když dojde k poškození srdce:](#)

Troponin je **druh bílkoviny, která se nachází ve svalech srdce**. Troponin se běžně v krvi nevyskytuje. Při poškození srdečního svalu se troponin dostává do krevního oběhu. S rostoucím poškozením srdce se do krve uvolňuje větší množství troponinu.

Ze studie vyplývá, že téměř u každého člověka dojde při očkování vakcínou COVID k malému poškození srdce, u některých je poškození mnohem větší než u jiných.

Ještě důležitější je, že to není jen trochu. Měří se 3. a 4. den a sklon klesal (viz [5:47](#)). Takže před 3. dnem byl pravděpodobně mnohem vyšší. Jinými slovy, skutečné poškození je pravděpodobně větší, než by naznačovaly křivky.

V thajské studii se u 1 z 28 chlapců, kteří dostali vakcínu, objevila subklinická myokarditida.

Kromě toho je míra subklinické myokarditidy u chlapců v thajské studii ([shrnutí v čase 2:47 ve videu](#)) 3,5 %, tj. 1 z 28 chlapců bude mít subklinickou nebo zjevnou myokarditidu.

Zdá se, že většina ostatních pacientů má poškození srdce, které je pod hranicí pro klasifikaci jako subklinická myokarditida.

Ačkoli [zvýšení troponinu mohou způsobit i jiné stavy](#), všechny tyto stavy jsou vzácné a je nepravděpodobné, že by se vyskytly současně s vakcinací.

Nezbývá než konstatovat, že vakcína poškozují srdeční sval téměř u každého, kdo se nechá očkovat.

Útok na studii

Studie byla dobře zpracována. [Profesor Christian Mueller](#) je uznávaný a je [autorem mnoha publikací o srdečním poškození ve vědecké literatuře](#).

Není tedy pravděpodobné, že by někdo mohl mít s útokem na studii úspěch. Ale lidé se o to pokusí, protože se jim výsledek nelíbí.

Kanadské řešení problému s troponinem: nedovolit lékařům nařídít test na troponin před vakcinací

V Kanadě je lékařská komunita v tomto ohledu velmi chytrá: nenechává lékaře měřit hladinu troponinu před očkováním, takže nikdo není o nic moudřejší.

Podle jednoho kanadského lékaře se po zavedení vakcín COVID změnila pravidla. Povolují měřit troponin pouze při pobytu v nemocnici. Lékaři tak nemohou porovnávat hladinu troponinu před očkováním s hladinou po očkování.

Je to chytrá technika, jak zajistit, aby nikdo nezjistil, jak nebezpečné jsou vakcíny. Očekával bych, že

tuto politiku přijmou i další země, aby se údaje nedostaly ven (ne že by na tom stejně záleželo).

Souhrn

Údaje ukazují, že očkování způsobuje určité poškození srdce téměř u každého, kdo se nechá očkovat.

Lékaři a orgány veřejného zdraví před těmito údaji jednoduše zavírají oči.

Většina lidí důvěřuje svým lékařům a orgánům veřejného zdraví.

AUTOR: Steve Kirsch

ZDROJ: stevekirsch.substack.com/p/new-study-shows-that-pretty-much

Překlad: David Formánek/otevrisvoumysl