

Steven Kirch: Thajská studie následků covid očkování prokázala, že téměř 30 % mladých lidí má kardiovaskulární poškození

- CZ24 News | 17. srpna 2022

THAJSKO: Nová thajská studie ukazuje, že u 29 % mladých dospělých došlo k zásadním kardiovaskulárním změnám. Více v článku.

Nová studie o kardiovaskulárních dopadech vakcín COVID provedená v Thajsku je obzvláště znepokojivá: u 29 % mladých dospělých došlo k netriviálním změnám srdečních biomarkerů.

Je úžasné, co všechno zjistíte, když jsou vědci provádějící studii poctiví a chtějí znát pravdu.

„Proč se podobná studie neprovádí v USA?“ ptá se profesor UCSF Vinay Prasad.

Sakra, vždyť ani neznáme d-dimery lidí před a po očkování.

Je to jen další důkaz zkorumpovanosti lékařské komunity, že po žádných takových údajích nikdo nevolal.

Tyto vakcíny jsou katastrofou. Každý den jsou důkazy horší a horší.

Zastaví tato nová studie očkování dětí? Samozřejmě že ne!

Podívejte se, i kdyby očkování zabilo každé dítě mladší 20 let, které si ho vezme, odepsali by úmrtí na něco jiného a doporučili by dětem, aby se nechaly očkovat. Vymývání mozků je tak špatné. Je to ohromující. Na faktech nezáleží.

Thajská studie

Vezměme si tuto [thajskou studii](#):



Tracy Høeg, MD, PhD
@TracyBethHoeg

...

Stunning prospective study from Thailand
Of 301 13-18 year olds following dose 2 pfizer

18% had abnormal EKG post vax

3.5% (7/202) males & 0 females developed
myoperi/peri or subclinical myocarditis, 2 were
hospitalized w/1 being observed in the ICU
preprints.org/manuscript/202...

Table 3. Characteristic of patients with elevated level of biomarkers or positive lab assessments.

Demographic				Clinical presentation										Echocardiography					
No.	Age (y)	Sex	Classification	Peak CRP (mg/L)	Peak ESR (mm/hr)	CK-MB level (ng/mL)				Troponin-T (pg/mL)				LVEF%				Pericardial effusion	
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	16	Male	Myopericarditis	86.6	19	1.25	109.6	2.36	1.67	3.18	593	37.2	10.9	75.3	73.7	77.2	84.7	Yes	
2	15	Male	Pericarditis	1.3	7	1.11	1.34	1.52	1.46	2.58	3.77	6.04	3.93	61.5	60.2	74.1	70.7	Yes	
3	17	Male	Pericarditis	10.5	8	1.99	1.87	1.72	2.71	4.54	8.03	7.87	6.75	78.9	77.5	61.0	67.2	Yes	
4	13	Male	Subclinical myocarditis	0.3	-	1.39	1.72	2.28	-	8.56	10.3	34.94	-	58.6	59.2	75.4	-	No	
5	14	Male	Subclinical myocarditis	0.5	-	3.00	2.06	3.06	-	3.73	28.6	38.68	-	79.6	60.1	76.2	-	No	
6	13	Male	Subclinical myocarditis	0.9	-	3.90	3.67	5.10	-	5.35	14.87	16.81	-	64.3	76.2	78.9	-	No	
7	17	Male	Subclinical myocarditis	4.3	-	2.25	2.32	2.41	-	3.12	13.06	15.44	-	70.8	52.4	53.8	-	No	

CRP, C-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; CK-MB, creatine kinase-myocardial band; LVEF, left ventricular ejection fraction.

9:23 AM · Aug 9, 2022 · Twitter Web App

2,083 Retweets 294 Quote Tweets 3,887 Likes

18 % dětí mělo po očkování abnormální EKG?!? To musí být nesmírně znepokojivé. Vakcína by tohle dělat neměla. Říkají lékaři rodičům, že vakcína způsobuje vážné srdeční problémy u 18 % dětí? Aspoň jim to řekněte.

Ve studii se uvádí, že „kardiovaskulární účinky byly zjištěny u 29,24 % pacientů, od tachykardie, palpitace a myo/perikarditidy“. Páni.

Téměř 30 % případů?!?! To není „vzácné“.

Konečně 3,5% výskyt myo/perikarditidy (včetně subklinické) u mužů ve věku 13-18 let také není vzácný. CDC nám lhalo. A to pořádně.

Zajímavé je, že se to shoduje s počtem případů myokarditidy na křesťanské škole Monte Vista ve Watsonville v Kalifornii, který přesáhl 1 %, ale kromě toho nechtěli veřejně prozradit žádné podrobnosti; musí chránit školu před žalobami. Velkou zásluhu na tom má ředitelka školy Nikki Danielsová, která se postarala o to, aby nikdo nezjistil, že očkování, které ve škole provádějí, dětem škodí. Když se začaly objevovat nežádoucí reakce, udělali správnou věc: mlčeli.

ZDROJ: [1](#) / [2](#)

Překlad: David Formánek/otevrisvoumysl.cz