

Studie Moderny a Národního institutu zdraví USA: OČKOVÁNÍ MRNA PROTI COVIDU BRÁNÍ TVORBĚ PROTILÁTEK A NARUŠUJE IMUNITNÍ SYSTÉM

- CZ24 News | 30. května 2022

USA: Upozorňuji, že se v tomto případě jedná o zcela oficiální studii, kterou však samozřejmě žádné mainstreamové médium nezveřejní, neboť by tím padla i jejich pokračující očkovací propaganda, která již zve všechny „svědky covidovy“ ke čtvrté „včelce“.

Je to výbušná studie, kterou americký Národní institut zdraví a Moderna zveřejnily jako předtisk v dubnu 2022: Jejich data naznačují, že vakcína Covid zhoršuje schopnost těla produkovat klíčový typ protilátek. Ty však pravděpodobně hrají důležitou roli v imunitní odpovědi těla na virus - zejména u mutací.

Uvedená studie je založena na údajích shromážděných během randomizované kontrolní studie společnosti Moderna pro její vakcínu mRNA-SARS-CoV-2 od července 2020 do března 2021. Zejména byla zkoumána protilátková odpověď na jádro nukleokapsidového proteinu koronaviru. Vědci učinili znepokojivý objev: **Mezi očkovanými účastníky a neočkovanými členy kohorty s placebem byl významný rozdíl v koncentracích protilátek proti nukleokapsidům.**

Neočkovaní měli významně vyšší hladiny těchto protilátek než očkovaní účastníci se stejnou virovou náloží. Zatímco protilátky byly zjištěny u 60 procent neočkováných, kteří prošli velmi mírnou infekcí Covid s nízkou virovou zátěží, byly tyto protilátky zjištěny pouze 10 procent očkovaných.

S vyšší virovou zátěží a mírnými onemocněními se u **71 procent neočkováných lidí vyvinuly protilátky proti nukleokapsidům, ve srovnání s pouhými 15 procenty očkovaných.** Pouze v případě závažných infekcí s velmi vysokou virovou náloží se u vakcín také vyvinuly tyto protilátky silněji.

Alex Berenson a Dr. Robert Malone [v nedávném článku uvádějí](#):

Neočkováná osoba má téměř 60% šanci na vznik protilátek i při extrémně mírné infekci; očkovaná osoba potřebuje téměř 100 000krát více viru v krvi, aby měla stejnou šanci.

Vědci provedli tato pozorování po snížení [sérokonverze](#) způsobené vakcínou – očkování tak brání imunitní obraně těla tím, že snižuje výskyt specifických protilátek. Autoři studie považovali koncentraci vakcíny na spike protein SARS-CoV-2 za možnou příčinu.

Poukázali také na to, že snížená protilátková odpověď proti nukleokapsidům ve **vzorcích vakcíny by mohla vést k nedostatečné detekci průlomových vakcinací** při měření vzorků protilátek.

Přesný lékařský význam těchto protilátek je do značné míry neprozkoumaný. Berenson a Malone píší:

Dlouhodobý imunologický a lékařský význam absence těchto protilátek je ještě méně jasný. Důvodem, proč se výrobci léčiv zaměřili na spike protein na prvním místě, spíše než na nukleokapsid, je to, že Sars-Cov-2 závisí na jeho spike proteinu pro jeho klíčový první útok na vnější stranu lidských buněk. Nukleokapsidový protein vystavuje až poté, co uvolní svou mRNA do samotné buňky. **Existují však určité důkazy, že protilátky proti nukleokapsidu později hrají důležitou roli v naší imunitní odpovědi.** A spike protein koronaviru rychle mutuje, což potenciálně činí protilátky proti němu zbytečnými. Například spike protein Omicronu se výrazně liší od spike proteinu předchozích variant. Nukleokapsidový protein mutuje mnohem pomaleji a poskytuje potenciální druhou obrannou linii.

Kolik dalších důkazů potřebují zastánci genových preparátů k tomu, aby si uvědomili, že tu nikdy o zdraví lidí nešlo??

[ZDROJ](#)

Překlad: necenzurovanapravda.cz/Slovanka