

ŠÚKL eviduje až 5 109 hlásení vedľajších účinkov vakcinácie! Medzi nimi aj kolaps či mozgová príhoda

- CZ24 News | 30. května 2021



SLOVENSKO: Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) [zverejnil](#) počet nahlásených vedľajších účinkov očkovania proti vírusu COVID-19. Ide až o 5 109 hlásení. Z toho sa až 344 prípadov týka závažných vedľajších účinkov vakcíny. Aké sú najčastejšie?

Pfizer (1,6 milióna podaných dávok, 2 089 hlásení, 1 úmrtie)

Medzi najčastejšie hlásené nežiaduce účinky po očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech patria bolestivosť, opuch alebo začervenanie v mieste aplikácie. Ďalej opuch a bolesť lymfatických uzlín v podpazuší, triaška, zimnica, horúčka. Tiež pocit na odpadnutie, únava, závrat, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, zvýšenie pulzu, slabosť. A tráviace ťažkosti, návaly tepla, pásový opar či kožné reakcie (vysyp).

Hlásené podozrenia závažných vedľajších účinkov: pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi (zväčša u pacientov liečených na hypertenziu), predkolapsový stav, kolaps, trombóza, alergické reakcie (1 anafylaktická reakcia), paréza tvárového nervu, zlyhanie očkovania, flebotrombóza, trombóza, pľúcna embólia.

Moderna (247 tisíc podaných dávok, 417 hlásení, 1 úmrtie)

Najčastejšie nežiaduce účinky po vakcinácii Modernou sú opuch, začervenanie a svrbenie v mieste aplikácie, horúčka, bolesť svalov, kĺbov, hlavy, zimnica, únava, nauzea a slabosť.

Čo sa závažných prípadov týka, ide najmä o dočasnú paralýzu, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, trombózu alebo stratu vedomia.



AstraZeneca (589 tisíc podaných dávok, 2 588 hlásení, 1 úmrtie)

ŠÚKL eviduje najčastejšie hlásenia na nežiaduce vedľajšie účinky po vpichnutí vakcíny od spoločnosti AstraZeneca ako horúčka, zimnica, triaška, bolesť hlavy a celého tela, únava (príznaky podobné chrípke), nauzea, vracanie, hnačka. Tiež kožné reakcie (výsyp), trpnutie, bolesť alebo tlak na hrudníku, smäd, slabosť, návaly tepla či porucha menštruačného cyklu.

Rovnako eviduje aj hlásenia závažných vedľajších účinkov ako krátkodobá strata vedomia, trombóza a flebotrombóza dolných končatín, pretrvávajúce zvýšenie tlaku krvi, paréza tvárového nervu, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu. Ďalej anafylaktická reakcia, erysipel, hyperpyrexia, flebitída dolných končatín, pľúcna embólia či dokonca náhla cievna mozgová príhoda.

Zdroj: <https://www.hlavnydennik.sk/>