

The Guardian: Nedoléčená chřipka. Je načase přestat používat označení pro neexistující dlouhý covid, tvrdí australský vědec a úředník

- editor007 | 25. března 2024

SVĚT: Překvapivý závěr přinesla studie australských lékařů pod vedením šéfa zdravotního úřadu australského státu Queensland, Johna Gerrarda. Podle jeho týmu příznaky obávaného dlouhého covidu nejsou v ničem specifické, [píše](#) se v britském Guardianu.

„Věříme, že je načase, abychom přestali používat označení ‚dlouhý covid‘,“ řekl Gerrard.

Jako dlouhý covid se popisuje zdravotní stav, při němž se i po vyléčení z covidu vyskytují stejné či podobné příznaky trvající několik měsíců či dokonce let. Mezi symptomy dlouhého covidu patří únava, změna či ztráta chuti a čichu nebo problémy se soustředěním.

Symptomy covidu a chřipky jsou v delším horizontu podobné

V rámci studie australští lékaři pozorovali následky covidu na 2 399 pacientech a dalších 2 713 lidech, kteří se léčili s jinou nemocí, jako je například chřipkou. Ve výsledku 3 % pacientů s covidem vykazovaly podobné dlouhodobé následky jako 4,1 % pacientů bez covidové infekce a 3,4 % pacientů, u kterých byla diagnostikována chřipka.

„Je to termín, který zbytečně vytváří strach, a v některých případech může bránit v uzdravení od dlouhodobých symptomů,“ argumentuje Gerrard vůči označení „douhý covid“.

Studie zatím není publikovaná. Nicméně [vědecký](#) web EurekAlert! zveřejnil tiskovou zprávu, která shrnuje postup i závěry výzkumu.

Celou studii představí lékařský tým vedený Gerrardem příští měsíc na Evropském kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí v Barceloně, která se koná ve dnech 27. až 30. dubna.

V souvislosti s výsledky tohoto výzkumu je relevantní si připomenout, jak nebezpečný vir SARS-CoV-2 ve skutečnosti byl.

Pro většinu světové populace bylo riziko úmrtí na covid-19 podobné úmrtí na chřipku

Ve studii publikované koncem roku 2022 tým vědců vedený stanfordským profesorem Johnem Ioannidisem shromáždil data z 31 zemí a [vypočítal](#), že *úmrtnost na infekci* (IFR) způsobenou covidem-19 byla před vakcinací pro věkovou skupinu mladší 69 let téměř 0,1 %, přičemž do věku 59 let je podíl násobně menší.

Na základě dat vypočítali výzkumníci ze Stanfordu následující průměrné IFR:

- Od narození do 19 let: 0,0003 % = zemřeli 3 z 1 000 000 nakažených
- 20 až 29 let: 0,003 % = zemřeli 3 ze 100 000 nakažených

- 30 až 39 let: 0,011 % = zemřel 1,1 z 10 000 nakažených
- 40 až 49 let: 0,035 % = zemřeli 3,5 z 10 000 nakažených
- 50 až 59 let: 0,129 % = zemřeli 1,3 z 1 000 nakažených
- 60 až 69 let: 0,501 % = zemřel 1 z 200 nakažených

Podle amerického *Centra pro kontrolu a prevence nemocí* (CDC) se IFR u sezónní chřipky (v období 2023/2024) [pohybuje](#) mezi 0,05 – 0,1 %.

2023-2024 U.S. Flu Season: Preliminary In-Season Burden Estimates

[Español](#) | [Other Languages](#) | [Print](#)

CDC estimates* that, from **October 1, 2023** through **March 16, 2024**, there have been:

30 – 56 million
flu **illnesses**



14 – 26 million
flu **medical visits**



340,000 – 700,000
flu **hospitalizations**



21,000 – 61,000
flu **deaths**



Dle českého Státního zdravotního úřadu (SZÚ) „v ČR počty nemocných každoročně dosahují statisíců, počty zemřelých v souvislosti s chřipkou zhruba 1 500 osob“.

„Pro představu, v sezóně 2018–2019 byla v České republice chřipková epidemie od 4. do 9. kalendářního týdne 2019. Za 6 epidemických týdnů vyhledalo praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob,“ uvádí dále SZÚ na webu.

Když tedy podělíme oněch 1 500 zemřelých s počty nakažených (v tomto případě pouze z oněch 6 epidemiologických týdnů), dostáváme se k 0,15 % a tedy, jak se píše dále na webu SZÚ, „situace je podobná i v ostatních vyspělých zemích“.

Zpracoval: Radovan Dluhý/ET-CZ

[ZDROJ](#)