

VAKCÍNA PFIZER: AŽ 80% DĚTÍ MÁ VELKÉ MNOŽSTVÍ VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ!

- CZ24 News | 1. června 2021



USA: Nová studie společnosti Pfizer o dětech ve Spojených státech: 78,9% očkovaných dětí ve věku od 12 let si stěžuje na vedlejší účinky!

Pfizer / BioNTech zveřejnil studii o bezpečnosti a používání své vakcíny.

Podává zprávu o současném stavu studií očkování v rámci nouzového povolení.

Asi 78,9 procent očkovaných dětí projevilo nějakou formu vedlejšího účinku.

Farmaceutický gigant zveřejnil 19. května 2021 37 stránkový „informační list“ o bezpečnosti a použití, který znovu publikoval Report24.

Zmínil současný stav očkovacích studií v rámci nouzového povolení EUA (Emergency Use Authorization). Americký úřad CDC potvrdil, že děti a dospívající mají onemocnění Covid-19 extrémně mírné, pokud vůbec. Děti a dospívající od 12 let navíc nemohou samy rozhodovat o injekci. Navzdory tomu jsou děti terčem. Studie ukázala, že až u 80% dětí se objevují nežádoucí účinky, které mohou vést k těžkému traumatu. Nový „informační list“ ukazuje, že vakcína BioNTech / Pfizer byla testována na 1097 dětech a dospívajících ve věku od 12 do 15 let. Alespoň 866 z 1097 dětí projevilo nějakou formu nepříjemného vedlejšího účinku.

U 466 z nich byly vedlejší účinky klasifikovány jako „mírné“, u 393 jako „mírné“ a u 7 jako „závažné.“ Byla provedena dvojité zaslepená studie, což znamená, že ani účastníci, ani experimentátoři nevědí, kdo dostává jakou léčbu. Kromě 1127 dětí a dospívajících, kteří dostali první dávku, a 1097, kteří dostali druhou dávku, dostalo 1127 a 1078 fyziologický roztok jako placebo.

Rozdíly byly pozoruhodné: mezi dětmi očkoványmi skutečnou vakcínou si více než pětkrát tolik stěžovalo na vedlejší účinky během prvních sedmi dnů.

Tady je detail těchto efektů:

První očkování:

Horečka nad 38 stupňů C (114 případů)

Únava (677)

Bolest hlavy (623)

Zimnice (311)

Zvracení (31)

Průjem (90)

Bolest svalů (272)

Bolesti kloubů (109)

Druhé očkování:

Horečka nad 38 stupňů Celsia (215)

Únava (726)

Bolest hlavy (708)

Zimnice (455)

Zvracení (29)

Průjem (65)

Bolest svalů (355)

Bolesti kloubů (173)

Jedním z potenciálně závažných vedlejších účinků, který byl pozorován nejčastěji u lidí, kterým byla podána vakcína, je život ohrožující zánět slepého střeva. Podle společnosti Pfizer / BioNTech je počet závažných krátkodobých nežádoucích účinků 0,4 až 0,8% u osob, kterým byla vakcína podána.

Z dlouhodobého hlediska se tyto účinky mohou zvýšit. V současné době žije ve Spojených státech přibližně 82 milionů lidí ve věku do 19 let.

Pokud by měly být všechny tyto děti a dospívající očkováni, dalo by se očekávat, že u 330 000 až 661

000 příjemců dojde k okamžitým závažným vedlejším účinkům. Systémové mediální a zdravotní úřady nicméně vedou děti a jejich rodiče k přesvědčení, že je naléhavě nutné je očkovat experimentálními produkty mRNA.

Autor: tereza

Zdroj: <https://tadesco.org/>