

# VAKCÍNA PFIZER SPÔSOBUJE AJ NEBEZPEČNÝ ZÁPÁL OKA “UVEITÍDU”! Slovenská očná lekárka preto prestala objednávať zaočkovaných, aby nenakazila ostatných pacientov! Viac v Izraelskej štúdii TU

- CZ24 News | 12. srpna 2021

**IZRAEL: Vakcína proti ochoreniu Covid-19 od Pfizer/BioNTech môže súvisieť s chorobou zvanou uveitída, zápalovým ochorením časti oka. O záveroch, ktoré vyplývajú z izraelskej štúdie vedenej profesorom Zohar Habot-Wilnerom, ktorú prijal k publikácii oftalmologický časopis Retina.**

Vedci pozorovali, že u **21 ľudí**, ktorí dostali dve dávky spomínanej vakcíny, sa objavila uveitída **deň až 14 dní po prvej dávke alebo deň až mesiac po druhej**.

Podľa Habot-Wilner všetci pacienti splnili kritériá umožňujúce dávať očné problémy do súvisu s očkovaním. „**Tento časový rámec je v súlade s inými správami o uveitíde po rôznych očkovacích látkach,**“ konštatoval.

Väčšina pozorovaných pacientov mala mierny priebeh- iba tri boli závažné – a všetky prípady prednej uveitídy bolo možné liečiť lokálnymi kortikosteroidmi a očnými kvapkami. Stav pacientov sa po liečbe zlepšil.

Aj napriek tejto novej komplikácii, profesor uviedol, že ochorenie nie je dôvodom pre neočkovanie. „**Záver je, že odporúčam očkovanie pre ľudí s uveitídou i bez nej,**“ vyhlásil.

Ak sa u niekoho po podaní vakcíny prejaví uveitída, mal by podľa odborníka byť dôkladne vyšetrený. Rozvoj uveitídy v súvislosti s očkovaním označil vo všeobecnosti za „**pomerne zriedkavý**“.

Pripomeňme, že začiatkom júla Európska lieková agentúra (EMA) po preskúmaní všetkých dostupných údajov uzavrela, že existuje možná súvislosť medzi veľmi zriedkavými prípadmi myokarditídy a perikarditídy a vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna). Očkovanie sa aj naďalej odporúča, pretože podľa úradov „celkové prínosy vakcín i naďalej prevyšujú ich riziká“.

## **Žilinská lekárka už upozorňovala na očkovaných**

V polovici júla sme informovali o prípade očnej lekárky zo Žiliny, ktorá odmietla objednávať na vyšetrenie očkovaných pacientov. Podľa jej názoru totiž predstavujú riziko pre nezaočkovaných, a

najmä maloletých pacientov. Je postoj dokonca prešetrovali úrady.

Ako vysvetlila lekárka pre médiá, k takémuto kroku sa odhodlala preto, lebo sa obávala prenosu iných infekčných chorôb z očkovaných pacientov na neočkovaných. Ide najmä o vírus herpesu a pásového oparu. Hovorila aj o tom, že **medzi očkovanými pacientmi pozorovala okrem hepatických ochorení aj časté zápal očí. Išlo len o pacientov, ktorí boli krátko po prvej alebo druhej dávke očkovania.**

**„Na prednej časti oka, na viečkach, na rohovke, uveitídy, to je vlastne pomerne ťažký vnútroočný zápal, ktorý svedčí o prehnanej aktivite imunitného systému a veľa herpetických ochorení,“** konkretizovala vtedy dôvod obáv očná lekárka s tým, že práve z tohto dôvodu na dva dni zastavila objednávanie očkovaných ľudí.

Úrady postup lekárky kritizovali. Magdaléna Jurkemíková zo Štátneho ústavu na kontrolu liečiv vtedy uviedla, že zápal očí nie je častým sprievodným znakom vakcinácie. Zaznamenané prípady boli podľa jej slov natolko zriedkavé, že nie sú uvedené ani v zozname možných nežiadúcich účinkov v dokumentácii lieku.