

VĚDECKÁ STUDIE DOKAZUJE SMRTELNĚ VÁŽNÉ POŠKOZENÍ IMUNITY U DĚTÍ PO APLIKACI PFIZER „VAKCÍN“

- CZ24 News | 10. září 2023

Jistě jste již zaznamenali termín VAIDS, který se začal objevovat brzy poté, co se začaly hromadně aplikovat experimentální genové injekce.

Jak zjistilo již několik studií, tak mRNA přípravky likvidují imunitu, takže tělo není schopno se bránit některým patogenům.

VAIDS pak vychází z názvu jiného onemocnění, které způsobuje ztrátu imunity – AIDS. Důsledky jsou v podstatě velmi podobné.

Prozatím byly studie prováděny pouze na dospělých, nicméně poslední studie zjišťovala, jaké mají genové injekce dopady na imunitu dětí...

Děti mají ve skutečnosti silný a adaptivní imunitní systém. Experimentální injekce Covid od společnosti Pfizer však u nich způsobují vážné dlouhodobé škody, jak objasňuje nově publikovaná studie. Stávají se náchylnější k jiným patogenům.

Již nějakou dobu je všeobecně známo, že Covid-19 ve skutečnosti nepředstavuje žádné nebezpečí, zejména pro děti a mladé lidi.

To zašlo nyní tak daleko, že několik zemí přestalo podávat injekce dětem, dospívajícím a mladým dospělým se zdůvodněním, že vedlejší účinky výrazně převažují nad přínosy.

Nyní vědci z Murdoch Children's Research Institute a Royal Children's Hospital v Melbourne v Austrálii zkoumali další imunologické účinky experimentálních injekcí mRNA u dětí.

Ačkoli vědci nepoužívají termín „VAIDS“ (syndrom získané imunodeficiency), právě na něj poukazují výsledky studie nazvané: „BNT162b2 - Očkování proti COVID-19 u dětí mění cytokinové reakce na heterologní patogeny a agonisty Toll-like receptorů“.

Vědci zjistili „celkový pokles cytokinových a chemokinových odpovědí“ na bakterie, houby a „necovidové“ viry u dětí po dvou injekcích mRNA od společnosti Pfizer.

„Naše výsledky naznačují, že vakcinace mRNA SARS-CoV-2 by mohla změnit imunitní odpověď na jiné patogeny, které by mohly způsobit onemocnění, kterým lze předcházet vakcínou i bez ní,“ napsali autoři v článku *Frontiers in Immunology*.

„To je zvláště důležité pro děti, protože jsou vystaveny vysoké míře mikrobů ve školce, ve škole a na společenských akcích; často se s těmito mikroby setkávají poprvé; a dostávají také vícenásobné očkování jako součást rutinních očkovacích schémat pro děti.“

Genové injekce od společnosti Pfizer by mohly nejen zvýšit náchylnost dětí k různým infekčním onemocněním, ale mohly by také negativně ovlivnit imunitní odpověď na různé další vakcíny.

Za určitých okolností by to také mohlo znamenat, že jakékoli vakcíny, které byly používány po dlouhou dobu, se v důsledku injekcí mRNA stanou prakticky nepoužitelnými, protože v důsledku toho byl „zlikvidován“ imunitní systém dětí.

Vědci zjistili, že krevní vzorky po očkování vykazovaly nižší cytokinovou odpověď na necovidové patogeny ve srovnání se stavem před očkováním.

Tato snížená imunitní odpověď přetrvávala zejména u virů jiných než Covid.

Vzorky krve odebrané po šesti měsících (!) ukázaly, že některé děti stále slabě reagují na proteiny z viru hepatitidy B a proteiny, které napodobují virovou infekci. Cytokinové reakce se však zvýšily po bakteriální expozici.

Podobné negativní imunologické reakce byly již dříve hlášeny ve studiích na dospělých (viz [zde](#) a [zde](#)). Nyní je stále jasnější, že je třeba v této oblasti provést podstatně více výzkumu.

Jde přece o lidské zdraví.

[ZDROJ](#)

Zpracoval: Slovanka/Necenzurovaná Pravda