

VÝSKUMNÍK VAKCÍN PO ŠTÚDII PFIZERU PRIPÚŠŤA „VEĽKÚ CHYBU“, HOVORÍ, ŽE SPIKE PROTEÍN JE NEBEZPEČNÝ „JED“. „NAJVIAC OHROZENÉ SÚ DOJČENÉ DETI, DETI A DOSPIEVAJÚCI. OHROZENÁ JE PLODNOSŤ ŽIEN AJ MUŽOV, OTÁZNE ZAČÍNA BYŤ DARCOVSTVO KRVÍ“. VÝROBCOVIA VAKCÍN ZATIAĽ MLČIA

- CZ24 News | 6. června 2021



„Desivý“ nový výskum neočakávané objavil proteín v krvnom obehu. Tento proteín súvisí s krvnými zrazeninami, poškodením srdca a mozgu a potenciálnymi rizikami pre dojčené deti a plodnosť

Nový výskum ukazuje, že spike proteín koronavírusu z očkovania COVID-19 sa dostáva do krvného obehu, čo vedci najskôr nepredpokladali, a čo zrejme vyvetľuje tisíce hlásených vedľajších účinkov krvných zrazenín a srdcových chorôb až po poškodenie mozgu a reprodukčné problémy, uviedol minulý týždeň kanadský výskumník vakcín Byram Bridle, ktorý sa dostal k japonskej štúdii spred pár dní, ktorú si dal vypracovať samotný Pfizer. Výsledky štúdie sú zarážajúce.

„Urobili sme veľkú chybu. Doteraz sme si to neuvedomovali“, uviedol Byram

Bridle, vírusový imunológ amimoriadny profesor na University of Guelph v Ontariu, v [rozhovore](#) s Alex Piersonovou minulý štvrtok, v ktorom poslucháčov varoval, že jeho posolstvo je „strašidelné“.

„Mysleli sme si, že spike proteín je skvelým cieľovým antigénom, nevedeli sme, že samotný spike proteín je toxín a je to patogénny proteín. Takže očkovaním ľudí ich chtiac-nechtiac zaočkujeme toxínom“, uviedol Bridle v relácii, ktorú nenájdete ľahko pomocou vyhľadávania Google, ale tento víkend sa stala virálnou na internete.

Bridle, výskumník vakcín, ktorý minulý rok získal [vládný grant](#) vo výške 230 000 dolárov na výskum vývoja vakcíny na COVID, povedal, že on a skupina medzinárodných vedcov podali japonskému regulačnému orgánu žiadosť o informácie, aby tak získali prístup k takzvanej „[biodistribučnej štúdii](#)“.

„Je to prvýkrát, čo vedci videli, kam tieto messenger RNA [mRNA] vakcíny idú po očkovaní“, hovorí Bridle. „Je to bezpečný predpoklad, že zostáva v ramennom svalu? Krátka odpoveď znie: absolútne nie. A to je veľmi znepokojujúce.“

Výskumníci v oblasti vakcín predpokladali, že nové mRNA vakcíny proti COVID sa budú správať ako „tradičné“ vakcíny a že spike proteín vakcíny – zodpovedný za infekciu a jej najzávažnejšie príznaky – zostane hlavne v mieste vpichu očkovania v ramennom svalu. Namiesto toho japonské údaje ukázali, že neslávne známy spike proteín koronavírusu sa dostáva do krvi, kde cirkuluje niekoľko dní po očkovaní a potom sa hromadí v orgánoch a tkanivách, ako je slezina, kostná dreň, pečeň, nadobličky, a čo Bridleho obzvlášť znepokojuje, hromadí sa v „pomerne vysokých koncentráciách“ vo vaječníkoch.

„Už dlho vieme, že spike proteín je patogénny proteín. Je to toxín. Ak sa dostane do obehu, môže spôsobiť poškodenie nášho tela“, povedal Bridle.

Spike proteín SARS-CoV-2 umožňuje infikovať ľudské bunky. Výrobcovia vakcíny sa rozhodli cielene použiť jedinečný proteín tak, že bunky očkovanej osoby prinútili, aby produkovali proteín, čo potom teoreticky spôsobuje imunitnú reakciu na proteín a zabraňuje infikovať ľudské bunky.

Veľké množstvo štúdií preukázalo, že najzávažnejšie účinky SARS-CoV-2, vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19, ako je zrážanie krvi a krvácanie sú dôsledkom účinkov spike proteínu samotného vírusu.

„Vedecká komunita zistila, že samotný spike proteín je takmer úplne

zodpovedný za poškodenie kardiovaskulárneho systému, ak sa dostane do obehu“, povedal Bridle poslucháčom.

U laboratórnych zvierat, ktorým bol do krvi injikovaný purifikovaný spike proteín, sa vyvinuli kardiovaskulárne problémy a bolo tiež preukázané, že spike proteín prešiel cez hematoencefalickú bariéru a poškodil mozog.

Závažnou chybou bolo podľa Bridleho presvedčenie, že spike proteín sa nedostane do krvného obehu.

„Teraz máme jasný dôkaz o tom, že vakcíny, ktoré vytvárajú bunky v našich deltových svaloch, produkujú tento proteín - že samotná vakcína plus proteín - sa dostanú do krvného obehu“, uviedol.

Bridle citoval nedávnu publikáciu [recenzovanej štúdie](#), ktorá odhalila spike proteín v krvnej plazme troch z 13 mladých zdravotníckych pracovníkov, ktorí dostali vakcínu COVID-19 od spoločnosti Moderna. U jedného z pracovníkov cirkuloval spike proteín 29 dní.

Účinky na srdce a mozog

Akonáhle je spike proteín v obehu, môže sa naviazať na špecifické receptory ACE2, ktoré sú na krvných doštičkách a bunkách, ktoré lemujú krvné cievy.



Ilustračné foto

„Keď sa to stane, môže urobiť jednu z dvoch vecí: Môže to spôsobiť zhlukovanie krvných doštičiek a to môže viesť k poruchám zrážanlivosti krvi. To je presne dôvod, prečo sme boli svedkami porúch zrážanlivosti krvi spojených s týmito vakcínami. Môže to tiež viesť ku krvácaniu.“

Bridle tiež uviedol, že spike proteín v obehú by vysvetľoval nedávno hlásené problémy so srdcom u dospievajúcich, ktorí boli zaočkovaní.

„Výsledky tejto uniknutej štúdie spoločnosti Pfizer, ktorá sleduje biodistribúciu mRNA vakcíny, nie sú prekvapujúce, ale dôsledky sú desivé“, povedala pre *LifeSiteNews* Stephanie Seneffová, hlavná výskumníčka z Massachusetts Institute of Technology.

„Teraz je jasné“, že obsah vakcíny sa dostáva do sleziny a žliaz, vrátane vaječníkov a nadobličiek. „Uvoľnený spike proteín sa vleje do média a potom sa nakoniec dostane do krvi a spôsobí systémové poškodenie. Receptory ACE2 sú bežné v srdci a mozgu, a práve preto spike proteín spôsobuje kardiovaskulárne a

kognitívne problémy”, uviedla Seneffová.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nedávno [oznámilo](#), že skúmajú správy o „miernych“ srdcových poruchách po očkovaní vakcínou COVID-19 a minulý týždeň bolo iba v štáte Connecticut hospitalizovaných [18 tínedžerov](#) pre problémy so srdcom, ktoré sa vyvinuli krátko po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Vakcína od AstraZeneca bola pozastavená v mnohých krajinách a už sa neodporúča mladším ľuďom pre jej súvislosť so život ohrozujúcimi a smrteľnými krvnými zrazeninami. Ale aj mRNA vakcíny proti COVID boli spojené so [stovkami hlásení o udalostiach zrážania krvi](#).

FDA bola varovaná pred nebezpečenstvom spike proteínu

Pediatrický reumatológ J. Patrick Whelan [varoval](#) Poradný výbor pre vakcíny a súvisiace biologické výrobky USA (VRBPAC) a Agentúru pre potraviny a liečivá (FDA) pred možným potencióm spike proteínu vo vakcínach COVID na mikrovaskulárne poškodenie spôsobujúce poškodenie pečene, srdca a mozgu „spôsobmi, ktoré neboli vyhodnotené v bezpečnostných skúškach. “

Aj keď Whelan nespochybnil hodnotu vakcíny proti koronavírusu, ktorá zastavuje prenos choroby (čo sa nepreukázalo u žiadnej vakcíne proti COVID v obehu), uviedol:

„Bolo by oveľa horšie, keby stovky miliónov ľudí utrpeli dlhotrvajúce alebo dokonca trvalé poškodenie mozgovej alebo srdcovej mikrovaskulatúry v dôsledku krátkodobého nedocenenia nežiaduceho účinku vakcín na báze spike proteínov v celej dĺžke na iné orgány.“

Spike proteín spojený s očkovaním v krvnom obehu by mohol vysvetliť nespočetné množstvo hlásených nežiaducich udalostí z COVID vakcín, vrátane 4 000 doterajších úmrtí a takmer 15 000 hospitalizácií hlásených americkému [Vaccine Adverse Event Reporting System](#) (VAERS) do 21. mája 2021. Keďže sa jedná o pasívny systém hlásenia, tieto správy sú pravdepodobne iba špičkou ľadovca nežiaducich udalostí, keďže [štúdia](#) Harvard Pilgrim Healthcare zistila, že **v skutočnosti je hlásených menej ako jedno percento vedľajších účinkov, ktoré by mali lekári hlásiť u pacientov po očkovaní do systému VAERS.**

Dojčené deti, deti a dospelí sú najviac ohrození

Bridle uviedol, že objav vyvolaný vakcínou spike proteínu v krvnom obehu bude mať dôsledky na programy darovania krvi.



Ilustračné foto

„Nechceme, aby sa tieto patogénne spike proteíny preniesli na citlivých pacientov, ktorí budú transfúzovaní touto krvou“, povedal.

Vedec zaoberajúci sa očkovaním tiež uviedol, že zistenia naznačujú, že dojčené deti, ktorých matky boli zaočkované, majú riziko, že do materského mlieka sa dostanú COVID spike proteíny .

Bridle povedal, že „všetky proteíny v krvi sú koncentrované v materskom mlieku“ a „našli sme dôkazy vo VAERS o poruchách krvácania u dojčiat v zažívacom trakte“.

Hoci ho Bridle neuviedol, jedna [správa VAERS](#) popisuje päťmesačné dojčené dieťa, ktorého matka dostala v marci druhú dávku vakcíny Pfizer. Nasledujúci deň sa u dieťaťa vyskytla vyrážka a stalo sa „neutíšiteľným“, odmietlo dojčenie a dostalo horúčku. Správa uvádza, že dieťa bolo hospitalizované s diagnózou trombotická trombocytopenická purpura, zriedkavá porucha krvi, pri ktorej sa tvoria krvné zrazeniny v malých cievach po celom tele. Dieťa zomrelo.

Nový výskum má tiež „vážne dôsledky pre ľudí, pre ktorých SARS Coronavirus 2 nie je vysoko rizikovým patogénom, a to zahŕňa všetky naše deti.“

Vplyv na plodnosť a tehotenstvo?

Otázky vyvoláva aj vysoká koncentrácia spike proteínu nájdená v semenníkoch a vaječníkoch v tajných údajoch Pfizeru zverejnených japonskou agentúrou. „Urobíme mladých ľudí neplodnými?“, spýtal sa Bridle.



Ilustračné foto

Boli zaznamenané tisíce hlásení o menštruačných poruchách u žien, ktoré podstúpili očkovanie proti COVID-19, a stovky hlásení o spontánných potratoch u očkovaných tehotných žien, ako aj o poruchách reprodukčných orgánov u mužov.

Zákerná špinavá kampaň

V reakcii na žiadosť poslal Bridle v pondelok ráno e-mailom vyhlásenie na *LifeSiteNews*, v ktorom uviedol, že od rozhovoru v rádiu dostal stovky pozitívnych e-mailov. Tiež dodal, že „proti mne bola zahájená zákerná ohováračská kampaň. K tomu patrilo vytvorenie ohováračskej webovej stránky s použitím môjho názvu domény.“

„Je to doba, v ktorej akademický štátny zamestnanec už nemôže čestne a na základe vedy odpovedať na legitímne otázky ľudí bez strachu z obťažovania a zastrašovania“, napísal Bridle. „Nie je však v mojej povahe dovoliť, aby sa verejnosti utajovali vedecké fakty.“

Priložil krátku správu s uvedením hlavných vedeckých dôkazov podporujúcich jeho vyhlásenia v rozhovore. Bola napísaná spolu s jeho kolegami z Canadian COVID Care Alliance (CCCA) – skupiny nezávislých kanadských lekárov, vedcov a odborníkov, ktorých deklarovaným cieľom je „poskytovať vysokokvalitné informácie o COVID-19 založené na dôkazoch s cieľom znížiť počet hospitalizácií a

zachrániť viac životov.“

Vyhlásenie sa zameralo na riziko pre deti a dospelých, ktoré sú terčom najnovších marketingových stratégií vakcín vrátane Kanady.

K 28. máju 2021 bolo u Kanadčanov vo veku 19 rokov a mladších 259 308 potvrdených prípadov infekcií SARS-CoV-2. Z nich bolo 0,048 % hospitalizovaných, ale len 0,004 % zomrelo, uvádza sa vo vyhlásení CCCA.

„Sezónna chrípka je spojená s vážnejším ochorením ako COVID-19.“

Vzhľadom na malý počet mladých jedincov zúčastnených sa na experimente v štúdiách vakcín od Pfizeru a obmedzené trvanie klinických štúdií CCCA uviedla, že na otázky týkajúce sa spike proteínu a iného vakcinačného proteínu je potrebné odpovedať skôr, ako budú deti a dospelí zaočkovaní, vrátane toho, či vakcína založená na spike proteíne prechádza cez hematoencefalickú bariéru, či vakcína založená na spike proteíne narúša produkciu spermií alebo ovuláciu a či vakcína založená na spike proteíne prechádza placentou a ovplyvňuje vyvíjajúce sa dieťa alebo či je v materskom mlieku.

LifeSiteNews poslal Public Health Agency of Canada vyhlásenie CCCA a požiadal o odpoveď na obavy Bridleho. Agentúra odpovedala, že na otázkach pracuje, ale pred zverejnením nezaslala žiadne odpovede.

Spoločnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson neodpovedali na otázky týkajúce sa Bridleho obáv. Spoločnosť Pfizer nereagovala na otázky o tom, ako dlho spoločnosť vedela o svojich výskumných údajoch, ktoré japonský orgán zverejnil a preukázal spike proteín v orgánoch a tkanivách zaočkovaných osôb.

Zdroj: <https://www.hlavnespravy.sk>