

Zastavte posilovací dávky proti covidu, vyzývá japonský kardiochirurg

- CZ24 News | 13. srpna 2022

JAPONSKO: Japonský kardiiovaskulární chirurg Dr. Kendži Jamamoto [v dopise odbornému časopisu Virology](#) vyzval k ukončení posilovacích dávek proti covidu-19. „Jako bezpečnostní opatření by mělo být další posilovací očkování ukončeno,“ napsal Jamamoto. Mezi jeho naléhavé obavy patří skutečnost, že [vakcíny](#) proti covidu-19 byly spojovány s imunitní trombotickou trombocytopenií vyvolanou vakcínou, která byla v některých případech pro pacienty smrtelná.

Jamamoto pracuje v Okamura Memorial Hospital v japonské Šizuoe. V dopise vysvětluje, že on a jeho kolegové se „setkali s případy infekcí, které je obtížné zvládnout“, včetně některých, které se vyskytly po operaci srdce otevřením hrudníku a nepodařilo se je dostat pod kontrolou ani po několika týdnech léčby několika antibiotiky.

Tito pacienti, říká Jamamoto, vykazovali známky oslabené imunity a někteří z nich zemřeli. Jamamoto se domnívá, že jejich potlačená imunitní funkce byla pravděpodobně způsobena očkováním proti covidu-19.

Angelina Farella, MD: „Je to volání na poplach“

Je vzácné, aby se kardiochirurg zapojil do státní očkovací politiky. Ještě vzácnější je, aby praktický lékař vyjádřil v prestižním lékařském časopise takový názor, který je v rozporu s lékařským statutem quo, a aby tento názor lékařský časopis sám publikoval.

Podobné obavy vyjadřují i další lékaři, kteří dosud nikdy veřejně nevystoupili. „Signály v nejlepších zdrojích, které máme v současné době k dispozici, což jsou naše údaje VAERS, přímo křičí,“ uvedla doktorka Angelina Farella, pediatrička z texaského Websteru, která rozšířila svou praxi o všeobecné lékařství a ošetřovala pacienty s covidem v době, kdy je ostatní lékaři v jejím okolí odmítali přijmout.

„Je to volání na poplach, kvůli srdečním onemocněním, úmrtím a poškozením způsobenými očkováním,“ řekla Farellaová. Za více než 25 let své lékařské praxe, která u Farellové zahrnuje každodenní očkování dětí, se s tak nebezpečnou vakcínou ještě nesetkala.

Jamamoto ve svém dopise časopisu Virology citoval [švédskou studii](#), která nenápadně uvedla, že osm až devět měsíců po očkování dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19 měly očkované osoby vyšší pravděpodobnost onemocnět covidem než neočkované kontrolní skupiny. Švédští výzkumníci tuto informaci uvedli pouze v grafu.

Jejich studie však poskytuje důkazy pro názor, že vakcíny mohou skutečně potlačovat imunitní funkce.

Autor: J. WANG AND J.MARGULIS

[ZDROJ](#)

Překlad: epochtimes.cz